

Chronic effects of Ritalin on fertilization and sperm viability in mouse exposed to Nicotine

Simin Fazelipour^{1*}, Zahra Tootian², Pantea Farjadazad³, Mona Karimi Asl⁴, Andishe Ahmadi⁵

1. Department of Anatomy, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University. Tehran-Iran.
2. Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Tehran-Iran .
3. Department of Pathology, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University. Tehran-Iran.
4. Islamic Azad University of Pharmaceutical Sciences Branch. Tehran-Iran.

(Received: 8 Dec 2014 Accept: 3 Feb 2016)

Abstract

Background: Nicotine is a nitrogenous organic compound which constitutes the major material of cigarettes. This toxic alkaloid is extracted from tobacco plant. Ritalin or Methylphenidate is a medicine from amphetamines group and structurally similar to cocaine with a widely usage. The objective of this study is surveying the vitality of sperm and fertility of the females received the gametes of the males used Nicotine and Ritalin. This study conducted in Islamic azad university Tehran medical science branch.(1392).

Methods: In this experimental study a total number of 120 male mice and 54 female mice were selected and the male mice were randomly divided into 11 experimental groups and one control group. In two experimental groups Ritalin was used 2 and 10 mg/kg of body weight, in three experimental groups nicotine was used 100, 200 and 400 mg/kg of body weight and in other experimental groups nicotine and Ritalin were used together as gavage for 40 days. At the end of the treatment period, three male mice from each group were selected and each was kept with a female in a separate cage. After 10 days the female mice were euthanized and by counting the fetuses and the corpora lutea, the percentage of fertility in females which is an indicator of the male mice were estimated. Also the remaining males were euthanized and after removing the testes for determining the percentage of alive sperm using eosin nigrosin, the numbers of stained sperms were specified. The data were calculated statistically by ANOVA and Tukey Test and the criterion of statistical derivation was considered $p < 0.05$.

Findings: The results of this study showed that percentage of fertility in the experimental group receiving nicotine [400 µg/kg/day] with nicotine comparing control group (95.42 ± 4.68) with the experimental group [400 µg/kg/day] (63.10 ± 38.37) the groups receiving Ritalin [2mg/kg/day] (64.96 ± 18.51) and [10mg/kg/day] (18.53 ± 16.72) compared with the control group (95.42 ± 4.68) showed a significant reduction. These results confirm more reduction of fertility percentage in Ritalin consumption than nicotine. Moreover in the other 6 groups consuming the combined form of nicotine with the doses of 100, 200 and 400 µg/kg/day and Ritalin with the doses of 2 and 10 mg/kg/day, fertility percentage should a significant reduction compared to the control group. Although this reduction in the group consuming nicotine at the dose of 400 µg/kg/day and Ritalin at the dose of 10 mg/kg/day (10.00 ± 20.03) was more intense than the control group.

Conclusion: From the results of this study it is deduced that in Nicotine using animals, the usage of Ritalin even with low doses can induce reduction of fertility.

Key words: Mouse, Nicotine, Fertility, Ritalin, Viability of sperm.

* Corresponding Author: Simin Fazelipour

اثر مزمن ریتالین بر درصد لقاح و قدرت زنده ماندن اسپرم در موش‌های مواجه شده با نیکوتین

سیمین فاضلی پور^{۱*}، زهرا طوطیان^۲، پانته‌آ فرجاد آزاد^۳، مونا کریمی اصل^۴، اندیشه احمدی^۴

- ۱- گروه علوم تشریحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران.
 ۲- گروه علوم پایه، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی.
 ۳- گروه پاتولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران.
 ۴- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی تهران.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۹/۱۶ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

چکیده

مقدمه: نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژن‌دار است که ماده اصلی دود سیگار را تشکیل می‌دهد. این الکلونید سمی از گیاه تنباکو استخراج می‌شود. ریتالین یا متیل فنیدیت (*methylphenidate*) دارویی است از گروه آمفتامین‌ها که از نظر ساختاری مشابه کوکائین و دارای مصرف گسترده‌ای است. هدف از این تحقیق، مطالعه حیات اسپرم و میزان باروری حیوانات ماده‌ای است که از گام‌های حیوانات نر مصرف‌کننده نیکوتین و ریتالین استفاده کرده‌اند. این تحقیق در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۱۲۰ سر موش نر و ۵۴ سر موش ماده بالغ انتخاب و حیوانات نر به صورت تصادفی به ۱۱ گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. در دو گروه تجربی از ریتالین به میزان دو و ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، در سه گروه تجربی از نیکوتین به میزان ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن و در سایر گروه‌های تجربی از نیکوتین و ریتالین توأم به صورت گاوآز به مدت ۴۰ روز استفاده شد. در پایان دوره تیمار، از هر گروه سه حیوان نر را انتخاب کرده و هر یک با سه حیوان ماده در قفس جدا گانه قرار گرفتند. پس از ۱۰ روز حیوانات ماده را بیهوش کرده و با شمارش جنین‌ها و جسم زرد تخمدان‌ها، درصد باروری موش‌های ماده که نشان‌دهنده درصد باروری در موش‌های نر است، محاسبه شد. همچنین باقیمانده حیوانات نر را بیهوش کرده و پس از خارج کردن بیضه، برای تعیین درصد اسپرم‌های زنده، با استفاده از آنوزین نیکروزین، تعداد اسپرم‌های رنگ شده مشخص شد.

داده‌ها از نظر آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (*ANOVA*) و تست توکی محاسبه و معیار استنتاج $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. **یافته‌ها:** نتایج نشان داد که درصد باروری در گروه‌های تجربی مصرف‌کننده نیکوتین به میزان ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن ($3/38 \pm 63/1$) و در گروه‌های مصرف‌کننده ریتالین به میزان دو ($51/18 \pm 64/96$) و ۱۰ میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن ($72/16 \pm 18/53$) نسبت به گروه کنترل ($68/44 \pm 95/42$) کاهش معناداری بود. این نتایج کاهش بیشتر درصد لقاح در مصرف ریتالین را نسبت به نیکوتین تأیید می‌کند. همچنین درصد لقاح در شش گروه مصرف‌کننده توأم نیکوتین به میزان ۴۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم با ریتالین به میزان دو و ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم درصد لقاح نسبت به گروه کنترل نیز کاهش معناداری را نشان داد که این کاهش در گروه مصرف‌کننده نیکوتین به میزان ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم و ریتالین به میزان ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ($10/0 \pm 20/0$) نسبت به گروه کنترل شدیدتر بود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که در حیوانات مصرف‌کننده نیکوتین، مصرف ریتالین حتی به میزان کم می‌تواند موجب کاهش باروری شود.

واژگان کلیدی: موش، نیکوتین، باروری، ریتالین، قدرت زنده ماندن اسپرم.

مقدمه

آمفتامین‌ها است (۳). این ماده به صورت پودر کریستالی سفید رنگی است که در آب محلول بوده و به‌صورت قرص‌های خوراکی ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرمی در داروخانه‌ها موجود است (۴). ریتالین دارای مصرف گسترده‌ای است و برای درمان اختلال‌های بیش فعالی و نقص توجه استفاده می‌شود (۵). بررسی‌های مختلف حاکی از تأثیر این دارو بر کاهش معناداری وزن بیضه‌ها و وزیکول سمنال در موش است (۶). همچنین مطالعه‌های گسترده‌ای در زمینه تأثیر این دارو بر وزن قلب، مغز، تخمدان و طحال انجام شده

تحقیق‌ها نشان داده که متیل فنیدیت می‌تواند به تغییرات ساختاری و عملکردی دائمی در دستگاه تولید مثلی منجر شود و بر درصد لقاح تأثیر بگذارد (۱). این دارو که ریتالین خوانده می‌شود پر مصرف‌ترین دارویی است که برای درمان کودکان مبتلا به اختلال‌های رفتاری و در بزرگسالان برای تمرکز ثبات مغزی، کنترل علائم نامطلوب، از جمله نقص توجه و اختلال بیش فعالی به کار می‌رود (۲). متیل فنیدیت یکی از ایروم‌های

نویسنده مسئول: سیمین فاضلی پور

پست الکترونیکی: simin_fazelipour@yahoo.com

نشانی: تهران، خیابان شریعتی - زرگنده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، گروه علوم تشریحی، تلفن ۰۲۱-۲۲۰۰۶۶۶۵، شماره ۰۲۱-۲۲۶۰۰۷۱۴، شماره ۰۲۱-۲۲۶۰۰۷۱۴

گروه نهم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان دو میلی‌گرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان ۲۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه دهم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان ۲۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه یازدهم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان دو میلی‌گرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان ۱۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه دوازدهم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان ۱۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. پس از ۴۰ روز از هر گروه شش حیوان نر را بیهوش کرده و م دوباره وزن نمو کرده و برای تعیین درصد اسپرم‌های زنده، مجرای دفران هر موش را قطعه قطعه کرده و در سرم فیزیولوژی با دمای ۳۷ قرار داده شد. سپس با قرار دادن یک قطره محلول روی لام نئوبار و استفاده از یک قطره ائوزین-نیگروزین با تهیه گسترش و خشک کردن با چراغ الکی به مطالعه اسپرم‌های زنده پرداخته شد چون اسپرم‌های زنده رنگ نمی‌پذیرند، ولی غشای اسپرم‌های مرده رنگ را جذب کرده و سیتوپلاسم آن‌ها رنگی می‌شود. با احتساب این ویژگی می‌توان درصد اسپرم‌های زنده را به‌دست آورد (۱۴). برای بررسی اثر ریتالین، نیکوتین و مصرف توام آن‌ها با دوزهای ذکر شده بر میزان باروری موش‌های نر پس از گذشت ۵۰ روز از شروع تیمار در گروه‌های آزمایشی، از هر گروه سه موش نر را انتخاب و هر موش نر با سه موش ماده بالغ در یک قفس جدا به مدت ۱۰ روز نگهداری شدند. طول دوره تیمار برای تعیین درصد باروری، ۵۰ روز در نظر گرفته شد. زیرا یک دوره اسپرماتوزن در موش سوری ۳۵ روز و با احتساب بلوغ اسپرم در اپیدیدیم ۵۰ روز پس از شروع تیمار با مواد ذکر شده محاسبه شد. موش‌های نر و ماده کنار یکدیگر قرار گرفتند پس از ۱۰ روز موش‌های ماده را جدا کرده با اثر بیهوش کرده و به بررسی تعداد جنین‌ها در رحم موش اقدام شد. سپس تخمدان‌ها را از بدن حیوان ماده جدا کرده و پس از شست و شو با میکروسکوپ لوپ تعداد جسم زرد تخمدان‌ها شمارش و با تقسیم تعداد جنین‌ها بر تعداد جسم زرد درصد باروری آن‌ها تعیین شد که با این احتساب درصد باروری موش‌های ماده که نشانگر میزان باروری موش‌های نر است به‌دست آمد (۱۴).

آزمون آماری: در مقایسه بین گروه کنترل با گروه‌های تجربی از آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و برای مقایسه بین گروه‌ها از تست تکمیلی Tukey استفاده و معیار استنتاج آماری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

نتایج نشان داد که قدرت زنده ماندن اسپرم در مقایسه بین گروه کنترل و گروه‌هایی که از ریتالین به میزان ۱۰ و ۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند، دارای اختلاف معناداری نبود، ولی در مقایسه درصد لقاح بین گروه‌های مصرف‌کننده ریتالین با دوزهای مختلف با گروه کنترل کاهش معناداری مشاهده شد ($p < 0.06$) (جدول ۱). همچنین نتایج به‌دست آمده از اثر نیکوتین به میزان ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن بر قدرت زنده ماندن اسپرم اختلاف معناداری بین گروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل نشان نداد. درحالی که درصد لقاح در گروه مصرف‌کننده نیکوتین با دوز ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل داشت ($p < 0.05$) (جدول ۲). در مقایسه هر یک از گروه‌هایی که ریتالین را به میزان دو و ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و نیکوتین را به میزان ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند، در مقایسه با گروه کنترل درصد لقاح کاهش معناداری را نشان داد ($p < 0.05$) که این کاهش در گروه مصرف‌کننده ریتالین و نیکوتین با دوز زیاد بسیار تأثیر گذارتر بود (جدول ۳).

بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف متیل‌فنیدیت در موش‌ها موجب کاهش معناداری درصد لقاح می‌شود. در این ارتباط مطالعه‌ای که روی میمون‌ها انجام شده حاکی از تأثیر متیل‌فنیدیت قبل از بلوغ به صورت مزمن و تأخیر در بلوغ و کاهش حجم بیضه است (۱۵). در بررسی که روی اثر متیل‌فنیدیت بر سلول‌های لاییدیک انجام گ شده نشان از تأثیر این ماده بر محور مغز-هیپوفیز-بیضه و در نتیجه تأثیر بر سلول‌های لاییدیک و کاهش تستوسترون است و می‌تواند بیانگر تأثیر این ماده بر متابولیسم تستوسترون که خود عاملی بر کاهش لقاح است، باشد (۱۶). تحقیق دیگری روی ۴۲ موش صحرایی از نژاد ویستار که به مدت ۹۰ روز به طریقه گاو از ریتالین با دوز ۵ و ۱۰ استفاده کردند، انجام شد و نتایج آن کاهش معناداری اسپرماتید و کاهش وزن بیضه بود که این تغییر در

است (۷). متیل‌فنیدیت از نظر ساختاری و دارویی شبیه یکی از مواد مخدر مانند کوکائین است و آسیب‌پذیری آن در افراد استفاده‌کننده به دلیل شباهت به کوکائین می‌تواند آثار مشابهی مانند اثر منفی بر اسپرماتوزن را ایجاد کند (۸). در مطالعه دیگری مشخص شده، موش‌هایی که از متیل‌فنیدیت به میزان ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ pp در مدت ۲۸ روز به صورت گاو از استفاده کرده‌اند، در دوز بالا افزایش معناداری در وزن کبد نسبت به گروه کنترل نشان داده‌اند (۶). نیکوتین یک آلکالوئید سمی روغن مانند است که از گیاه تنباکو به دست می‌آید (۹). مطالعه‌ای که روی اثر مزمن الکل و نیکوتین بر پارامترهای اسپرم موش صحرایی انجام شده، مشخص شده است در صورتی که موش‌های نر به مدت ۵۰ روز در گروه‌های مختلف با اتانول، نیکوتین، کورتینین و الکل تیمار شوند، کاهش معناداری را در قدرت زنده ماندن اسپرم در مقایسه با گروه کنترل نشان می‌دهند (۱۰). در مطالعه‌ای که روی ۴۰ سر موش نر و ۲۵ سر موش ماده که با نیکوتین به مدت ۳۰ روز تیمار شده بودند، نشان داد که نیکوتین به‌عنوان یک ماده سمی می‌تواند بر مورفولوژی و تحرک اسپرم اثر داشته و موجب قطعه قطعه شدن DNA اسپرم و عقیمی شود (۱۱). در مطالعه دیگری که روی اثر نیکوتین بر ویژگی‌های اسپرم انجام شده مشخص شده که ساختار اسپرم به‌طور قابل توجهی دچار اختلال می‌شود و کاهش حجم مایع منی در گروه‌های مصرف‌کننده نیکوتین به همراه کاهش میل جنسی در حیوانات نر مشاهده شده است. همچنین مشخص شده که افزایش دوز نیکوتین می‌تواند موجب افزایش اختلال در ویژگی‌های اسپرم شود (۱۲). همچنین کاهش درصد لقاح در اثر مصرف سیگار و تأثیر بر عملکرد بیضه به صورت *invivo*، *Invitro* را نیز از سوی محققان دیگر گزارش شده و مطالعه روی بافت بیضه، حاکی از تأثیر سیگار بر سلول‌های لاییدیک و در نتیجه کاهش هورمون تستوسترون و کاهش اسپرماتوزن و به دنبال آن کاهش عقیمی است (۱۳). مطالعه‌هایی در رابطه با اثر متیل‌فنیدیت روی غدد درون‌ریز و گندها حساس هستند، چرا که در این مرحله نابالغ نسبت به تخریب غدد درون‌ریز و گندها حساس هستند، چرا که در این مرحله سیستم تولید مثلی در حال تکامل بوده و تغییرهای کوچک در سطح هورمون‌ها می‌تواند به تغییرهای ساختاری و عملکردی دائمی این دستگاه منجر شود. حال با توجه به اینکه نیکوتین و ریتالین هر یک به تنهایی توانسته‌اند موجب تغییرهایی در یکی از فاکتورهای اصلی تولید مثلی شوند و با توجه به اینکه احتمال می‌رود افرادی که معتاد به سیگار بوده و از ریتالین نیز استفاده می‌کنند با مشکلات بیشتری مواجه شوند، بنابراین بر آن شدیم که اثر ریتالین و نیکوتین را بر قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح افراد معتاد به سیگار که تحت درمان با متیل‌فنیدیت هستند، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲ مطالعه کنیم.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی ۱۲۰ سر موش سوری نر و ۵۴ سر موش سوری ماده بالغ نژاد Balb/C را از مؤسسه تحقیقاتی رازی تهیه و به آزمایشگاه دانشکده انتقال داده شدند. ابتدا موش‌ها نشاندار شده و در اتاق حیوانات با درجه حرارت 21 ± 3 درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۴۵-۵۵ درصد، ۱۲ ساعت روز و ۱۲ ساعت شب نگهداری شدند. حیوانات دسترسی مداوم به آب و غذا داشتند. برای انجام آزمایش ابتدا موش‌ها با ترازوی دقیق وزن شده و به‌طور تصادفی به ۱۲ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. در این مطالعه تجربی از ریتالین هیدروکلراید و نیکوتین به صورت محلول در آب مقطر با روش خوراکی (گاو از) به مدت ۴۰ روز استفاده شد. دوز استفاده شده برای ریتالین دو و ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن و میزان مصرف نیکوتین، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در نظر گرفته شد. حیوانات به ترتیب زیر طبقه‌بندی شدند: گروه اول: گروهی که هیچ دارویی دریافت نکردند و به‌عنوان کنترل استفاده شدند. گروه دوم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه سوم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان دو میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه چهارم: گروهی که روزانه از نیکوتین به میزان ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه پنجم: گروهی که روزانه از نیکوتین به میزان ۲۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه ششم: گروهی که روزانه از نیکوتین به میزان ۱۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه هفتم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان دو میلی‌گرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند. گروه هشتم: گروهی که روزانه از ریتالین به میزان ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند.

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌کنید مصرف نیکوتین در گروه‌های تجربی مطالعه شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم تغییر معناداری را ایجاد نمی‌کند، ولی بر درصد لقاح در مصرف‌کننده‌های ۴۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان می‌دهد. جدول ۱- درصد قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح در گروه‌های مطالعه شده (کنترل و تجربی دریافت‌کننده نیکوتین)

گروه ها	کنترل	گروه ۳ تجربی 100 µg/kg/day	گروه ۲ تجربی 200 µg/kg/day	گروه یک تجربی 400 µg/kg/day
قدرت زنده ماندن اسپرم	$\bar{X}\pm SD$ 100±0 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 6/98±1/2 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 1/97±3/5 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 1/96±3/6 ^a
در صد لقاح	$\bar{X}\pm SD$ 4/95±6/4 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 3/89±2/2 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 2/81±3/17 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 1/63±3/38 ^b

داده‌ها از نظر آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و Tukey Test محاسبه شد و معیار استنتاج آماری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. حروف ناهماهنگ در هر ستون افقی دال بر اختلاف معنادار است.

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌کنید مصرف ریتالین در گروه‌های تجربی مطالعه شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم تغییر معناداری را ایجاد نمی‌کند، ولی بر درصد لقاح در مصرف‌کننده‌های ریتالین با دوزهای مختلف کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان می‌دهد. جدول ۲- درصد قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح در گروه‌های مطالعه شده (کنترل و تجربی دریافت‌کننده ریتالین)

گروهها	کنترل	گروه ۲ تجربی 2mg/kg/day	گروه یک تجربی 10mg/kg/day
قدرت زنده ماندن اسپرم	$\bar{X}\pm SD$ 100±0 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 1/99±0/2 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 7/98±3/1 ^a
در صد لقاح	$\bar{X}\pm SD$ 4/95±6/4 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 9/64±5/18 ^b	$\bar{X}\pm SD$ 5/18±7/16 ^c

داده‌ها از نظر آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و Tukey Test محاسبه شد و معیار استنتاج آماری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. حروف ناهماهنگ در هر ستون افقی دال بر اختلاف معنادار است.

همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌کنید مصرف توام ریتالین و نیکوتین در گروه‌های تجربی مطالعه شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم تغییر معناداری را ایجاد نمی‌کند، ولی بر درصد لقاح در همه گروه‌ها کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان می‌دهد که در گروه مصرف‌کننده توام ریتالین و نیکوتین با دوز زیاد شدیدتر است.

جدول ۳- در صد قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح در گروه‌های مطالعه شده (کنترل و تجربی دریافت‌کننده توام نیکوتین و ریتالین)

گروه ها	کنترل	نیکوتین ۱۰۰ µg/kg/day ریتالین ۲ mg/kg/day گروه ۱۱ تجربی	نیکوتین ۱۰۰ µg/kg/day ریتالین ۱۰ mg/kg/day گروه ۱۰ تجربی	نیکوتین ۲۰۰ µg/kg/day ریتالین ۲ mg/kg/day گروه ۹ تجربی	نیکوتین ۲۰۰ µg/kg/day ریتالین ۱۰ mg/kg/day گروه ۸ تجربی	نیکوتین ۴۰۰ µg/kg/day ریتالین ۲ mg/kg/day گروه ۷ تجربی	نیکوتین ۴۰۰ µg/kg/day ریتالین ۱۰ mg/kg/day گروه ۶ تجربی
قدرت زنده ماندن اسپرم	$\bar{X}\pm SD$ 100.0 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 99.5±3.3 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 98.8±2.0 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 97.2±8.0 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 97.1±06.04 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 1/97 ±2/0 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 0/97.±08/ ^a
درصد باروری	$\bar{X}\pm SD$ 95/4±6/4 ^a	$\bar{X}\pm SD$ 6/39±1/46 ^b	$\bar{X}\pm SD$ 7/45±6/42 ^b	$\bar{X}\pm SD$ 9/43±9/42 ^b	$\bar{X}\pm SD$ 83/40±52/46 ^b	$\bar{X}\pm SD$ 8/39±6/46 ^b	$\bar{X}\pm SD$ 0/10±0/20 ^c

داده‌ها از نظر آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و Tukey Test محاسبه شد و معیار استنتاج آماری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. حروف ناهماهنگ در هر ستون افقی دال بر اختلاف معنادار است.

تأثیر بر آکسونم اسپرم که نتیجه آن کاهش تحرک را به دنبال خواهد داشت نیز انجام شده است (۹). همچنین در بررسی دیگری آثار نیکوتین روی مشخصات اسپرم و لقاح در ۴۰ سر موش صحرایی نر بالغ که در پنج گروه به مدت ۳۰ روز با دوزهای ۵۰ و یک میلی‌گرم بر کیلوگرم انجام شد، کاهش میل جنسی گزارش شده است (۱۲). در این ارتباط در تحقیقات *invitro* که آثار نیکوتین را بر تحرک اسپرم و فعالیت‌های حیاتی آن نشان می‌دهد بر خلاف نتایج این تحقیق، نشان‌دهنده کاهش درصد زنده ماندن اسپرم و افزایش تعداد اسپرم‌های آپوپتوزی و قطعه قطعه شدن DNA است (۱۹). کاهش معناداری قدرت زنده ماندن اسپرم در مصرف نیکوتین در افراد سیگاری که در مدت سه سال روی ۲۰ مرد سیگاری با روزی ۳۰ سیگار انجام شده نیز حاکی از تأثیر این ماده بر حیات اسپرم است (۲۰) که نتایجی بر خلاف این تحقیق را نشان می‌دهد. بنابراین شاید بتوان تنوع زیادی از آثار نیکوتین بر قدرت زنده ماندن اسپرم را گزارش

اثر افزایش بیان $p53$ و $TGF\beta 1$ و افزایش مرگ با آپوپتوز سلول‌ها گزارش شده است (۱). با توجه به تمایل افراد مبتلا به ADHD به مصرف سیگار (۱۷) و استفاده از ریتالین به‌عنوان پرمصرف‌ترین دارو در مبتلایان به این اختلال (۱۸) و اهمیت تولید گامت سالم در توانایی بارور کردن تخمک با اسپرم و انتقال ژن‌های سالم از طریق گامت‌ها به سلول تخم، بر آن شدیم که اثر مصرف مزمن ریتالین را در معتادان به سیگار در حیات اسپرم و درصد باروری در موش‌های سوری نر بالغ نژاد Balb/C مطالعه کنیم. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف نیکوتین با دوزهای مختلف بر حیات اسپرم اختلاف معناداری را با گروه کنترل نشان نداد، ولی در دوز بیشتر درصد لقاح کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. کاهش درصد لقاح در مصرف بالای نیکوتین در این تحقیق نشان‌دهنده تأثیر این ماده بر پارامترهای دیگر اسپرم است که از آن جمله می‌توان تأثیر بر تحرک اسپرم را گزارش کرد. بررسی‌هایی مبنی بر تأثیر این ماده بر اسکلت سلولی در نتیجه

درصد لقاح در اثر مصرف نیکوتین را شاید بتوان اثر مهاری این ماده بر آنزیم‌های ذکر شده دانست. در گزارش دیگری که روی ۴۰ سر موش صحرائی نر در گروه‌های مختلف مصرف‌کننده در مطالعه‌ای که از سوی محققان دیگر روی تأثیر نیکوتین بر جنین داخل رحمی با مصرف روزانه یک میلی‌گرم برای دو هفته و استفاده از آن برای ۲۱ روز از زمان جفت‌گیری انجام شده، تغییرهایی در ساختار بیضه در جنین نر و اپیدیدیم مشاهده شد که نشان‌دهنده تأثیر این ماده بر بافت بیضه است که خود می‌تواند عامل دیگری بر کاهش درصد لقاح باشد (۲۶) در این مطالعه نیز مشخص شد که مصرف مزمن نیکوتین با دوز زیاد و به مدت طولانی می‌تواند بر باروری اثر گذاشته و موجب کاهش معناداری درصد لقاح شود. همچنین در این تحقیق مشخص شد که متیل‌فنیدیت بر قدرت زنده ماندن اسپرم تأثیر چندانی ندارد، ولی موجب کاهش معناداری درصد لقاح می‌شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نیکوتین و ریتالین با دوزهای مصرفی و در مدت زمان ذکر شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم بی‌تأثیر بوده، ولی در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش درصد لقاح می‌شوند که در دوز زیاد اختلاف و کاهش معنادار نسبت به گروه کنترل بسیار شدیدتر است. از نتایج این مطالعه چنین استنباط می‌شود که نیکوتین و ریتالین کاهش درصد لقاح را از طریق تأثیر بر پارامترهای دیگر اسپرم اعمال می‌کند و به این طریق موجب تغییر درلقاح می‌شوند.

تشکر و قدردانی: از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران نهایت تشکر را دارم.

منابع:

- Cansu A1, Ekinci O, Ekinci O, Serdaroglu A, Erdogan D, Coskun ZK, Gürgen SG. Methylphenidate has dose-dependent negative effects on rat spermatogenesis: decreased round spermatids and testicular weight and increased p53 expression and apoptosis. *Hum Exp Toxicol*. 2011; 30 (10): 1592-600.
- Michael Liebreuz; Anja Frei; Carl Erik Fisher; Alex Gamma; Anna Buadze; Dominique Eic. Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Nicotine Use: A Qualitative Study of Patient Perceptions *BMC Psychiatry*. 2014;14 (141)
- Dafny N, Yang PB. The role of age, genotype, sex and route of acute and chronic administration of methylphenidate: a review of its locomotor effects. *Brain Res Bull* 2006; 68 (6): 393-405.
- Accardo P, Blondis TA. What's all the fuss about Ritalin? 2001; *J Pediatr* 138 (1): 6-9
- Dusan Kolar, Amanda keler and et al. Treatment of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *-Neuropsychiatr Dis Treat*. 2008 Apr; 4 (2): 389-403
- Manjanatha MG, Shelton SD, Dobrovolsky VN, Shaddock JG, McGarrity LG, Doerge DR, et al. Pharmacokinetic, dose-range and mutagenicity studies of methylphenidate hydrochloride in B6C3F1 mice. *Environ Mol Mutagen* 2008; 49 (8): 585-593.
- Teo S, Stirling D, Thomas S, Hoberman A, Kiorpes A, Khetani V. A 90-day oral gavage toxicity study of D-methylphenidate and D,L-methylphenidate in Sprague-Dawley rats. *Toxicol* 2002; 179 (3): 183-196.
- Stanislav L et al. Performance enhancing non-prescription use of Ritaline A comparison with amphetamines and cocaine. (2015): *Journal of addictive diseases*. 26 (: 4): 1-6
- Fazelipour S, Hadipour Jahromy M, Tootian Z, Babaeei L, Kiaei SB. Effects of nicotine on sperm motility in male mice under methylphenidate treatment. *Med Sci J Islam Azad Uni Teh* 2011; 21 (1): 1-7.
- Ezzatabadipour M, Azizollahi S, Sarvazad A, Mirkahnouj Z, Mahdinia Z, Nematollahi-Mahani SN. Effects of concurrent chronic administration of alcohol and nicotine on rat sperm parameters. *Andrologia* 2012; 44 (5): 330-336.
- Arabi M1, Shareghi B. Anti-fertility effect of nicotine. *Zhonghua nan ke xue* 2005; 11 (5): 323-330.
- Oyeyipo IP, Raji Y, Emikpe BO, Bolarinwa AF. Effects of Nicotine on Sperm Characteristics and Fertility Profile in Adult Male Rats: A Possible Role of Cessation. *J Reprod Infertil* 2011; 12 (3): 201-207
- A Kapawal and et al. Effects of paternal cigarette smoking on testicular function , sperm fertilizing capacitr, embryonic development , and blastocyst capacity for

کرد که دلایل آن زمان، دوز و روش استفاده شده از آن است. در تحقیقی دیگر کاهش درصد لقاح را در مصرف نیکوتین، ناشی از کاهش تولید روزانه اسپرم می‌دانند (۲۱). در یک بررسی نشان داده شده که نیکوتین می‌تواند بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز که یک آنزیم کلیدی برای تولید انرژی در اثر فعالیت‌های متابولیسمی اسپرم‌های نرمال است، اثر مهاری داشته و در نتیجه بر فعالیت اسپرم تأثیرگذار باشد (۲۲). از طرفی کاهش قدرت زنده ماندن اسپرم در ارتباط بین کیفیت سمن و جویدن تنباکو در مردان نیز گزارش شده است (۲۳). در بررسی دیگری که روی قدرت زنده ماندن اسپرم در اثر نیکوتین و سیگار انجام گرفته مشخص شده که نیکوتین موجب کاهش قدرت زنده ماندن اسپرم را موجب می‌شود (۲۴). از عوامل دیگری که به کاهش درصد لقاح منجر می‌شود، می‌توان اثر نیکوتین را بر سلول‌های لایدیگ دانست. در این رابطه کاهش سلول‌های لایدیگ و در نتیجه کاهش ترشح تستوسترون که عامل دیگری در کاهش درصد لقاح است بیان شده (۸). در مطالعه‌ای که روی آثار مستقیم zearalenone و a-zearalenone روی سلول‌های لایدیگ انجام شده، نشان داد که بلوغ سلول‌های لایدیگ برای سنتز تستوسترون به حضور آنزیم‌های (3β-HSD)β hydroxysteroid dehydrogenase نیاز دارد. اندازه‌گیری ترشح تستوسترون و بررسی میزان رونویسی از آنزیم‌های فوق که در بلوغ سلول‌های بینابینی موثر است، نشان می‌دهد که این دو ماده می‌توانند اثر مهارکننده روی ترشح تستوسترون داشته باشند و این اثر مهاری از طریق اختلال در رونویسی برای سنتز این آنزیم‌ها انجام شده است (۲۵) بنابراین یکی از دلایل کاهش

implantation in rat. (2004): *J OF Andrologia* V 36. 57-68.

- Fazelipour S, Tootian Z. Effect of heroin used in Iran on male fertility of mice. *Int. J. Pharmacol* 2007; 3 (5): 406-410.
- Mattison DR, Plant TM, Lin HM, Chen HC, Chen JJ, Twaddle NC, et al. Pubertal delay in male nonhuman primates (*Macaca mullata*) treated with methylphenidate. 108 (39): 16301-16306.
- Midzak AS1, Chen H, Papadopoulos V, Zirkin BR. Leydig cell aging and the mechanisms of reduced testosterone synthesis. *Mol Cell Endocrinol* 2009; 299 (1): 23-31.
- Carmela RM, Linkugel JD, Bevins RA. Nicotine as a Conditioned Stimulus: Impact of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder Medications. *Exp Clin Psychopharmacol* 2007; 15 (5): 501-509.
- Kollins SH, MacDonald EK, Rush CR. Assessing the abuse potential of methylphenidate in nonhuman and human subjects. *Pharmacol Biochem Behav* 2001; 68: 611-627.
- Condorelli RA1, La Vignera S, Giacone F, Iacoviello L, Vicari E, et al. In vitro effects of nicotine on sperm motility and bio-functional flow cytometry sperm parameters. *Int J Immunopharmacol* 2013; 26 (3): 739-746.
- Panayiotis M, Zavos EDS. Effects of seminal plasma from cigarette smokers on sperm Viability and Longevity. *Fertil Steril* 1998; 69 (3): 425-429.
- Zenzes MT. smoking and reproduction ; gene damage to human gametes and embryos. *Hum Reprod Update* 2000; 6: 122-131.
- Ghaffari MA, Abromand M, Motlagh B. Invitro inhibition of Human sperm Creatine Kinase by nicotine cotinine and cadmium, as a mechanism in smoker Men infertility Royan Institue. *Int J fertil Steril* 2008; 2 (3): 125-130.
- Said TM, Ranga G, Agarwal A. Relationship between semen quality and tobacco chewing in men undergoing infertility evaluation. *Fertil Steril* 2005; 84 (3): 649-653.
- Ezzatabadipour M1, Azizollahi S, Sarvazad A, Mirkahnouj Z, Mahdinia Z, Nematollahi-Mahani SN. Effect of concurrent chronic administration of alcohol and nicotine on rat sperm parameters. *Andrologia* 2012; 44 (5): 330-336
- Yang J, Zhang Y, Wang Y, Cui Sh. Toxic effects of zearalenone and a-zearalenol on the regulation of steroidogenesis and testosterone production in mouse Leydig cells. *Toxicol in vitro* 2007; 21 (4): 558-565
- Lagunov A1, Anzar M, Sadeu JC, Khan MI, Bruin JE, Woynillowicz AK, et al. Effect of in utero and lactational nicotine exposure on the male reproductive tract in peripubertal and adult rats. *Reprod Toxicol*. 2011; 31 (4): 418-423.