

## شیوع حاملگی ناخواسته در مراجعین به بیمارستان مهدیه در سال ۱۳۷۴

دکتر فخرالملوک یاسایی\*

\* استادیار، بخش زنان، مرکز آموزش درمانی آیت‌ا. طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

### خلاصه

**سابقه و هدف:** افزایش سریع جمعیت، جلوگیری از بارداری را از اهداف مهم مراکز بهداشتی ساخته است. ارائه روش‌های متفاوت و متنوع جلوگیری از بارداری، انتخاب روش مناسب توسط افراد با شرایط طبی، اجتماعی و اقتصادی مختلف را ممکن می‌سازد. **مواد و روشها:** تحقیق حاضر که به بررسی میزان حاملگی ناخواسته با روش‌های جلوگیری از حاملگی اختصاص دارد، مطالعه‌ای مقطعی می‌باشد. این تحقیق روی ۱۳۰۰ خانم باردار که به درمانگاه مامایی جهت ختم حاملگی یا زایمان در ماههای بهمن و اسفند سال ۱۳۷۴ مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. خصوصیات زنان باردار شرکت‌کننده در این طرح براساس سن فعلی، طول دوره زناشویی، تعداد زایمان و نوع روش جلوگیری از بارداری با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. **یافته‌ها:** در این تحقیق ۱۳۰۰ خانم باردار که در محدوده سنی ۴۴-۱۴ سال قرار داشتند، وارد شدند. در کل، حاملگی ناخواسته در ۳۶۸ مورد (۲۸/۳٪) دیده شد. حاملگی‌های ناخواسته با روش انزال منقطع ۶۴ مورد (۱۷/۴٪)، کاندوم ۳۰ مورد (۸/۱٪)، شیردهی ۱۱ مورد (۳٪)، قرص‌های پروژستینی موسوم به ۸ minipill مورد (۲/۲٪)، IUD ۵ مورد (۱/۳٪)، روش بستن لوله در زن ۴ مورد (۱/۱٪) و روش وازکتومی ۱ مورد (۰/۳٪) گزارش گردید. از نظر سنی بیشترین حاملگی ناخواسته در گروه سنی ۲۸-۱۸ سال (۲۳۰ مورد، ۶۲/۵٪) بود.

**نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:** این بررسی بر لزوم آموزش زوجین و تشویق آنها به استفاده از روش‌های مؤثر و مطمئن در جلوگیری از بارداری تأکید می‌نماید.

**واژگان کلیدی:** حاملگی ناخواسته، روشهای پیشگیری از بارداری

### مقدمه

رشد روزافزون جمعیت و مشکلات متعاقب آن اعم از مسائل اقتصادی-اجتماعی یکی از معضلاتی است که هم‌اکنون در اغلب کشورهای جهان مطرح می‌باشد. به لحاظ اهمیت مسأله در جهت یافتن راه‌حل‌های مناسب برای کنترل جمعیت، تلاشهای فراوانی انجام گرفته و با در حال انجام می‌باشد.

تنظیم خانواده با جلوگیری از حاملگی‌های ناخواسته، حاملگی‌هایی که در سنین پائین یا بالا و یا در فواصل بسیار کوتاه بوقوع می‌پیوندد، می‌تواند زندگی میلیونها کودک را نجات بخشد و با حفظ زندگی مادران موجب استحکام

خانواده‌ها گردد. تحقیقات باروری جهان در سال ۱۹۸۰ نشان داد که حدود نیمی از زنان متأهل در جهان فرزند بیشتری نمی‌خواهند. اما درصد نسبتاً کمی از آنها از یک روش پیشگیری از حاملگی مدرن یا سنتی استفاده می‌کنند. این در حالیست که در کشورهای در حال توسعه نیاز به استفاده از یک روش مؤثر، بدون عارضه و قابل برگشت جلوگیری از حاملگی بیش از پیش احساس می‌شود. البته هر روش پیشگیری از حاملگی فواید و معایب خاص خود را دارد و همه روشها در همه فرهنگها پذیرفته نمی‌شود. برای هر کس در هر زمان یک روش مناسب‌تر بوده که ممکن است برای فرد دیگری قابل استفاده نباشد، به این

(۳/۳۳٪)، کمتر از ۱۸ سال (۷/۲٪) و بیشتر از ۳۹ سال (۵/۲٪) قرار داشتند. از نظر طول دوره زناشویی بیشترین حاملگی ناخواسته در زوجینی بود که بیش از ۱۰ سال زناشویی داشتند (۸/۴۰٪). حاملگی ناخواسته در ۱۲۱ خانم باردار (۹/۳۲٪) که طول دوره زناشویی آنها بین ۱۰-۵ سال بود و همچنین ۹۷ خانم باردار (۳/۲۶٪) که طول دوره زناشویی آنها کمتر از ۵ سال بود، دیده شد. از نظر تعداد زایمان بیشترین حاملگی ناخواسته در زوجینی بود که ۴-۲ زایمان داشتند (۲/۴۶٪)، این در حالیست که در ۴۴٪ خانمهایی که کمتر از ۲ زایمان داشتند، حاملگی ناخواسته دیده شد. در نمودار ۱ ارتباط بین حاملگی ناخواسته با روشهای پیشگیری از بارداری آمده است. همانطور که در این نمودار مشخص است، بیشترین درصد حاملگی ناخواسته (۶/۶۶٪) در روش منقطع (withdrawal) دیده می‌شود.

دلیل در برنامه‌های تنظیم خانواده، طیف وسیعی از روش‌ها را به متقاضیان ارائه می‌دهند (۱). هر ساله تقریباً نیم‌میلیون زن در کشورهای پیشرفته در نتیجه یکی از عوارض حاملگی می‌میرند که متأسفانه سقط غیرقانونی یکی از علل اصلی این مرگهاست (۲). مغایرت بین مدت زمانی حدود ۴ سال (در ابتدای شروع فعالیت جنسی) که یک زن امید به باروری دارد و تقریباً ۴ دهه فاصله بین شروع قاعدگی و یائسگی که یک زن مستعد باروری است، بخوبی نشاندهنده این موضوع است که چرا تقریباً همه زنان در خطر حاملگی ناخواسته در بخشی مهمی از دوره باروریشان قرار دارند. زنان در بسیاری از این سالها دو هدف عمده دارند: جلوگیری از حاملگی‌های ناخواسته و حفظ قابلیت بارداری برای سالیان بعد (۴). امید است تحقیق حاضر که به بررسی حاملگی‌های ناخواسته با روشهای جلوگیری از حاملگی اختصاص داده شده است، بتواند گامی در جهت میل به هدف کنترل جمعیت، کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان و تقویت بنیان خانواده برداشته باشد.


## مواد و روشها

تحقیق حاضر مطالعه‌ای مقطعی می‌باشد که در جامعه زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامائی بیمارستان مهدیه جهت ختم حاملگی یا زایمان، در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۷۴ صورت گرفته است. در این مطالعه ۱۳۰۰ خانم باردار مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از زنانی که در حین استفاده از یک روش جلوگیری از بارداری، باردار شده بودند، جمع‌آوری و بررسی گردید.

در این راستا اطلاعات مربوط به سن، روش مورد استفاده، تعداد زایمان و مدت دوره زناشویی در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفت.

## یافته‌ها

در این تحقیق ۱۳۰۰ خانم باردار در محدوده سنی ۱۴-۴۴ سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۳۶۸ مورد (۲۸/۳٪) حاملگی ناخواسته وجود داشت که از نظر سنی بیشترین حاملگی ناخواسته در گروه سنی ۱۸-۲۸ سال (۲۳۰ مورد، ۶۲/۵٪) بود. پس از آن گروه‌های سنی ۲۹-۳۹ سال



نمودار ۱: توزیع حاملگی‌های ناخواسته به تفکیک روش‌های جلوگیری از حاملگی، بیمارستان مهدیه تهران، ۱۳۷۴

## بحث

این مطالعه نشان می‌دهد از میان ۱۳۰۰ خانم باردار بررسی شده، ۳۶۸ مورد (۲۸/۳٪) حاملگی ناخواسته با یکی از روشهای جلوگیری از بارداری داشتند. از ۶/۴ میلیون بارداری که در ایالات متحده در سال ۱۹۸۸ رخ داد، بیشتر از نصف آنها بدون قصد بوده است (۴). مطالعه‌ای که در کشور چین در سال ۱۹۸۰ صورت گرفت نشان داد، یک عامل مهم در بارداری، شکست روشهای پیشگیری بوده

موارد حاملگی ناخواسته با IUD وسیله در داخل رحم وجود داشته است. با توجه به اینکه انجام سقط عمدی در کشور ما غیرقانونی است، بعضی از زنان خود اقدام به دستکاریهای خانگی کرده و از بیان آن نیز خودداری می نمایند، در نتیجه مشخص کردن اینکه چند درصد حاملگی های ناخواسته بطور واقعی به سقط عمدی منجر شده است، امکان پذیر نیست. این موضوع در مطالعات دیگران نیز مطرح شده است (۶،۸).

از نظر سنی در میان زنان مورد مطالعه، بیشترین حاملگی ناخواسته مربوط به گروه سنی ۱۸-۲۸ سال بوده است (۱/۶۲/۵) که از این نظر مشابه مطالعه ای در ایالات متحده می باشد (۹). آمار فوق نشان می دهد که زنان جوان در معرض خطر بیشتری برای حاملگی ناخواسته قرار دارند. در ایران با توجه به پای بندی افراد به اصول اعتقادی و ارزش والائی که بنیان خانواده دارد، حاملگی ناخواسته در نوجوانان و زنان ازدواج نکرده کمتر دیده می شود، ولی با توجه به آمار بالای ازدواج در سنین کمتر از ۱۸ سال و طول دوره ای که در طی آن قدرت باروری و در نتیجه خطر حاملگی ناخواسته و عوارض ناشی از بارداری وجود دارد، باید به ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی در جامعه، دادن آگاهی های لازم در مورد خطرات بارداری های زیر ۱۸ سال و لزوم جلوگیری از بارداری در این سنین، همت گماشت.

است (۱۰). در تحقیق ما بیشترین حاملگی ناخواسته در روش انزال منقطع (۶۶/۶٪) مشاهده شد. مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری (۱۷/۴٪) و استفاده از کاندوم (۸/۱٪) از جمله سایر روشهای ناموفق پیشگیری از بارداری در این تحقیق بوده اند. مطالعه ای که توسط اشعری در سال ۱۳۷۷ انجام شد، شکست روش انزال منقطع ۵۹٪، کاندوم ۳۰٪، قرص ۱۰٪ و IUD ۱٪ گزارش شده است (۱۱).

در مطالعه خوش بین برای روش منقطع ۴۵/۲٪، قرص ۱۶/۹٪ و کاندوم ۱۵٪ شکست ذکر شده است (۳). این آمار نشان دهنده وجود میزان بالائی از حاملگی ناخواسته در کشور ماست، همچنانکه در سایر نقاط جهان چنین معضلی وجود دارد (۷،۵). در مورد روشهای قطعی پیشگیری از حاملگی، ۴ مورد (۱/۱۱٪) حاملگی ناخواسته با روش بستن لوله های رحمی و یک مورد (۰/۳٪) حاملگی ناخواسته با روش وازکتومی داشتیم. در مطالعه خوش بین شکست بستن لوله های رحمی در زنان ۱/۸٪ گزارش شده است (۳).

وجود درصد بالای حاملگی ناخواسته با روش انزال منقطع نشان دهنده لزوم آموزش زوجین و تشویق آنها به استفاده از روشهای مؤثر و مطمئن است. استفاده از روشی مانند شیردهی فقط به صرف عدم وجود قاعدگی و بدون توجه به شروطی که لازمه استفاده از این روش است، نشان دهنده آموزش ناکافی زنان است. لازم به ذکر است که در تمامی

## REFERENCES

- 1- Pardthaisong T, Gray RH. In utero exposure to steroid contraceptive and outcome of pregnancy. Am J Epidemiol 1991; 134: 795-803.
- 2- Westhoff C, Rosenfield A. The impact of family planning on women's health: current opinion. Obstet Gynecol 1993; 5: 793-7.
- 3- خوش بین س. میزان شیوع حاملگی های برنامه ریزی نشده در جمعیت روستائی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پژوهنده ۱۳۷۷؛ سال سوم، شماره ۱، صفحات ۲۹ تا ۳۳.
- 4- Forrest JD. Preventing unintended pregnancy: The role of hormonal contraceptives. Am J Obstet Gynecol 1994; 170: 1485-9.
- 5- Fu H, Darroch JE, Haas T, Ranjit N. Contraceptive failure rate: New estimates from the 1995 national survey of family growth. Fam Plann Perspect 1999; 31: 56-63.
- 6- Trussell J, Vaughan B. Contraceptive failure, method related discontinuation and resumption of use: results from the 1995 national survey of family growth. Fam Plann Perspect 1999; 31: 64-72.
- 7- Bairagi R, Islam MM, Barua MK. Contraceptive failure: Levels, trends and determinants in Matlab, Bangladesh. J Biosoc Sci 2000; 32: 107-23.

8- Jones EF, Forrest JD. Contraceptive failure in the United States: Revised estimated from the 1982 national survey of family growth. *Fam Plann Perspect* 1989; 21: 103-9.

9- Grady WR, Hayward MD, Yagi J. Contraceptive failure in the United States: Estimated from the 1982 national survey of family growth. *Fam Plann Perspect* 1986; 18: 200-9.

10- Wang D, Diamond I. The impact on fertility of contraceptive failure in China in the 1980. *J Biosoc Sci* 1995; 27: 277-84.

۱۱- اشعری ژ. میزان شیوع حاملگی‌های ناخواسته و پوشش تنظیم خانواده در جمعیت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران سال ۱۳۷۷. پژوهنده ۱۳۷۹؛ سال پنجم، شماره ۱، صفحات ۲۹ تا ۳۳.