

پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی

سال ۲۶، شماره ۲، صفحات ۱۴۰-۱۳۷ (تابستان ۱۳۸۱)

گزارش یک مورد فاسیولاهپاتیکا در ریه

دکتر عبدالحسین داؤدآبادی*، دکتر صفرعلی طلاری**

* استاد بار، بخش جراحی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

** دانشیار، گروه انگلشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

خلاصه

فاسیولاهپاتیکا یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات گیاه‌خوار است و انسان بطور اتفاقی از طریق مصرف سبزیجات آلوده به متاثر کرده آن مبتلا می‌شود. این انگل بطور معمول موجب درگیری کبد و مجاری صفراءوی می‌شود، اما ندرتاً بصورت اکتوپیک ریه، حفره صفاق، مغز، تیروئید، اپیدیدیم و چشم در جریان فاسیولازیس گرفتار می‌شوند. بیمار خانم ب-ج ۳۷ ساله به علت تنگی نفس و سرفه‌های خلطدار همچنین تب، لرز و تعریق مراجعه نموده است. در گرافیهای انجام شده پلورال افیوژن و آمپیم لوکوله و توده‌ای در ناف ریه مطرح شد. در نمونه BAL کرم بالغ فاسیولاهپاتیکا تشخیص داده شد. پیشنهاد می‌شود در بیماران با علائم فوق، علاوه بر بررسی‌های معمول از نظر فاسیولاهپاتیکا، اسمیر نیز انجام گیرد.

واژگان کلیدی: فاسیولاهپاتیکا، ریه

سال ۱۹۶۸ و ۷۰۰ مورد در گilan و مازندران در سال

۱۳۷۷-۷۸ گزارش شده است^(۱).

گرچه موارد نابجای فاسیولاهپاتیکا نادر و اغلب با مشکلات تشخیصی همراه هستند، در این راستا یک مورد فاسیولاهپاتیکای نابجا در ریه که موجب عفونت ریه، پلورال افیوژن و آمپیم شده است، معرفی می‌شود.

مقدمه

فاسیولاهپاتیکا یکی از ترماتودهای مجاری صفراءوی - کبدی حیوانات گیاه‌خوار است که در اکثر نقاط جهان به خصوص در مناطقی که دامداری رواج دارد، شایع است (۱). انسان به ندرت و به طور اتفاقی از طریق مصرف سبزیجات آلوده به متاثر کر، به این بیماری مبتلا می‌گردد. در شرایط عادی لارو انگل پس از عبور از جدار دئونوم با پاره کردن کپسول گلیسون وارد پارانشیم کبد می‌شود و پس از مدتی در مجاری صفراءوی قرار می‌گیرد و به کرم بالغ تبدیل می‌شود (۲). جایگزینی نابجای فاسیولاهپاتیکا در حفره صفاق (۳)، مغز (۴)، ریه‌ها (۴)، غده تیروئید (۵)، کیسه صفرا و مجاری صفراءوی (۶،۷)، عضلات چشم (۳)، نسوج زیر جلد (۸) و اپی دیدیم به ندرت رخ می‌دهد.

شیوع فاسیولاهپاتیکا در انسان در مناطقی از دنیا بخصوص در سال‌هایی که میزان بارندگی زیاد بوده، بطور اپیدمی اتفاق افتاده است. بطور مثال ۵۰۰ مورد بیماری در منطقه Lyon شمال فرانسه، ۴۹ مورد در ولیز در غرب انگلیس در


معرفی بیمار

بیمار خانم ب-ج، ۳۷ ساله، خانه‌دار، اهل و ساکن بادرود کاشان در تاریخ ۱۳۷۸/۵/۱۰ بعلت تنگی نفس و سرفه‌های خلطدار برنگ صورتی که از حدود بیست روز پیش بوجود آمده بود، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مراجعه نمود. تنگی نفس وی بتدریج افزایش یافته، تب و لرز و تعریق بخصوص عصرها و شبها و درد پلورتیک چپ هم بر آن اضافه شد. کاهش وزن ۳-۴ کیلوگرمی و ضعف و بیحالی در جریان بیماری پدید آمد. در معاینه، بیمار بی حال و توکسیک بود. فشار خون بیمار در حد طبیعی بود ولی تعداد ضربانات قلب ۹۵ عدد در دقیقه، تعداد تنفس ۲۶ عدد


در دقیقه و درجه حرارت $38/5^{\circ}\text{C}$ گزارش شد. بیمار دیسترس تنفسی متوسط داشت.

در معاینه، expansion و حرکات ریه چپ محدود شده و در سمع نیز کاهش واضح صداهای ریوی وجود داشت. ریه مقابل در معاینه سالم بود. در گرافی PA و نیمرخ کدورت در قاعده ریه چپ همراه با پلورال افیوژن وجود داشت. (شکل‌های ۱، ۲). در CT scan نیز علاوه بر افیوژن، آمپیم لوکوله بهمراه آتلکتازی سگمانهای تحتانی وجود داشت. وجود توده‌ای در ناف ریه، احتمال لنف نود بزرگ یا لنفوم را مطرح می‌کرد (شکل‌های ۳، ۴). آنالیز گازهای خون شریانی در بیمار طبیعی بود. در آزمایش خون محیطی، لکوسیتوز ($WBC=14140\text{ mm}^3$) با $\text{PMN}=80\%$ لنفوسيت 6% ، سلولهای باند 14% و بدون ائوزینوفیلی مشاهده شد. $\text{ESR}=100$ و قند خون ناشتا 166 mg/dL . CRP $=+1$ میلی گرم در دسی لیتر بود. آزمایش کلسمیم، فسفر، آنزیم‌های کبدی و آلkalین فسفاتاز طبیعی بود. سونوگرافی کبد و مجاري صفراوي طبیعی گزارش شد. آزمایش رایت، ویدال، کامل ادرار و بررسی مدفوع از نظر تخم فاسیولاهپاتیکا طبیعی بود. باسیل BK نیز منفی بود. PPD کشت خلط و اسپیر از لحاظ باسیل اسید فست نیز منفی بود. برای بیمار tap پلور انجام شد که $\text{LDH}=1020$ و $\text{glucose}=260\text{ mg/dL}$ و آلبومین $3/5$ میلی گرم درصد (اگزوداتیو) گزارش شد. با توجه به گرافیها، بیمار با احتمال لنفوم و یا آمپیم و کیست هیداتید عارضه‌دار، کاندید توراکوتومی تجسسی قرار گرفت. قبل از آن در برونوکسکوپی انجام شده ضایعه اندوبیرونشیال گزارش نشد ولی BAL انجام شد و ترشحات آن برای سیتولوژی کشت و اسپیر برای باسیل اسید فست فرستاده شد.

در توراکوتومی صورت گرفته پلورال افیوژن بهمراه فیبرین فراوان در ناحیه لوب تحتانی همراه با *peel* ضخیم و آمپیم لوکالیزه وجود داشت. دکرتیکاسیون کامل انجام شد. قسمتی از لوب چپ بصورت سفت و کبدی (هپاتونیزه) شده بود ولی تومورال نبود. لنف نودهای ناف ریه بصورت واکنشی بزرگ شده بودند. نمونه‌هایی از لنف نودها و *peels* برای پاتولوژی ارسال شد. پس از شستشوی همی‌توراکس، جداره سینه بخیه شد. سیر بعد از عمل طبیعی بوده و بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.



شکل ۱: گرافی ساده PA سینه بیمار در بد و ورود به بیمارستان



شکل ۲: گرافی نیمرخ سینه بیمار در بد و ورود به بیمارستان


پاتولوژی ریه نیز قطعات بافت نکروز با ارتشاج شدید سلولهای التهابی یک و چند هسته‌ای که با تشخیص بالینی آمیم مطرح شده مطابقت داشته است، گزارش شد.

بحث


بطور معمول آلودگی با فاسیولاپاتیکا چهره بالینی ملایمی دارد. این سندرم به دو فاز تقسیم می‌شود. در فاز اول یا acute migratory phase، انگل از حفره صفاق به طرف کپسول کبد و پارانشیم ریه مهاجرت می‌کند. در این فاز تب، درد ناحیه RUQ و یا اپیگاستریک همراه با آورزنيوفیلی وجود دارد. در این حالت آزمایش مدفوع از نظر تخم انگل منفی است. در طی فاز استقرار (فاز دوم)، بیشتر افراد آلوده شده بدون علامت هستند. در کل علایم بالینی این انگل بستگی به مهاجرت آن به ارگانهای مختلف بدن دارد (۱۰). در فرم معمول آن که مجاری صفر اوی در گیر می‌شوند، دردهای شکمی در ۶۵٪، تب در ۶۰٪ و خستگی و کاهش وزن در ۳۵٪ موارد وجود دارد. فاسیولا خستگی و کاهش وزن در ۳۵٪ موارد وجود دارد. فاسیولا به صورت اکتوپیک (نابجا) در قسمت‌هایی نظیر صفاق به صورت توده تومورال صفاقی خود را نشان می‌دهد. همچنین در جریان در گیری مغزی تهاجم به مغز موجب اختلالات فوکال عصبی می‌شود (۳). انگل در صورت تهاجم به ریه ممکن است موجب سرفه، تنگی نفس و هموپتیزی شود. علایم تنفسی عموماً شایع نیستند ولی در بعضی موارد علایم ریوی ممکن است اولین علامت عفونت باشند که در این صورت انفیلتراسیون پارانشیمال مشابه سندرم لوفلر و پلورال افیوژن شایعترین تظاهرات رادیولوژیک بیماری می‌باشند (۱۱).

در گزارش Flores و همکاران انفیلتراسیون ریوی محیطی دو طرفه در اثر لارو مرده انگل که در پارانشیم ریه تخریب شده بود، گزارش شد (۴). آنها معتقد هستند کاوش‌های جامع اپیدمیولوژیک بیشترین کمک را در تشخیص فاسیولاپاتیکا و دیگر انگل‌هایی که تمایل به نفوذ به ریه دارند (pulmonary histotropism) خواهند کرد.

در این مطالعه علائم بالینی به صورت سرفه و خلط فراوان همراه با درد پلورتیک همی‌توراکس چپ و تب و لرز مشاهده شد. با توجه به منفی بودن آزمایش مدفوع در مرحله حاد (۴، ۱۰)، در میان روش‌های آزمایشگاهی، الیز



شکل ۳: مقطع CT اسکن سینه بیمار قبل از عمل که لب تحتانی را همراه افیوژن پلورال نشان می‌دهد



شکل ۴: مقطع CT اسکن سینه بیمار قبل از عمل که در مقطع کارينا آمیم لوکوله دیده می‌شود

گرافیهای بعدی بیمار کاملاً طبیعی گزارش شد. از نمونه‌های ترشح و لاوازبرونشها که برای TB و آلودگی انگلی فرستاده شد، کرم بالغ فاسیولاپاتیکا بدست آمد. در

بعدی بیمار هیچ گونه علائم بالینی مجاری صفر اوی و کبدی نداشت و از نظر تخم انگل منفی بود.

توصیه می شود در ارزیابی BAL در عفونت ها و بیماری های ریوی، به فاسیولاهپاتیکا به خصوص در مناطق گرمسیر و مرطوب توجه بیشتری شود (۱۳).

با توجه به مورد مطرح شده توصیه می کنیم در بیماران مبتلا به عفونت ریه و پلورال افیوژن و آمپیم لوکوله از نمونه لاواز برونکیال علاوه بر آزمایش های معمول ارزیابی از نظر فاسیولاهپاتیکا نیز انجام گیرد. این کار موجب کاهش موارد جراحی در بیماران خواهد شد.

جهت تشخیص و پیگیری بیشترین ارزش را دارد و روش های IFA (۱۲) و CCIE از حساسیت کمتری برخوردار هستند. تشخیص فاسیولاهپاتیکا در این بیمار کاملاً اتفاقی و از طریق بررسی ترشحات خلط بود.

در عمل جراحی که قبل از تشخیص انجام گرفت مقادیر فراوان فیبرین ضخیم، پلورال افیوژن غلیظ و نسبتاً کدر همراه با آمپیم لوکوله و peel ضخیم روی ریه وجود داشت. با دکتریکاسیون peel و خارج سازی مواد فیبرینی و شستشوی همی توراکس، ریه به تدریج حجم خود را بدست آورد و expansion کامل پیدا نمود. در پیگیری های

REFERENCES

- 1- Esteban JG, Flores A, Aguirre C. Presence of very high prevalence and intensity of infection with *Fasciola hepatica* among Aymara children from Northern Bolivian Altiplano. *Acta Trop* 1997; 66(1): 1-14.
- 2- Liulk, Horinasuto KT. Liver and intestinal flukes. *Gastrointest Endosc Clin N Am* 1996; 25: 627-36.
- 3- صائبی اسماعیل. فاسیولاهپاتیکا. در کتاب بیماریهای انگلی در ایران. جلد دوم، چاپ اول، ۱۳۷۰، صفحات ۱۱ و ۱۷.
- 4- Flores M, Merino A, Aguirre EJ. Pulmonary infiltrate as first sign of infection by *Fasciola hepatica*. *Eur J Respir Dis* 1982; 63: 231-3.
- 5- عدل یحیی، صدیق منوچهر. گزارش یک مورد فاسیولا در غده تیروئید. ماهنامه دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۳۵؛ سال سیزدهم، شماره هشتم.
- 6- Mohseni H, Ebrahimi MA. Human fascioliasis in Iran. Report of a case with fasciola in biliary duct. *Bull Soc Path Exot* 1969; 62(5): 871-4.
- 7- معیر حسین فرد و همکاران. گزارش یک مورد فاسیولازیس مجرای صفر اوی در انسان از اصفهان. مجله بهداشت ایران ۱۳۵۶؛ سال ششم، شماره ۳.
- 8- گل چای جواد، دولتی یحیی. تظاهرات جلدی فاسیولیازیس. اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، آذر ماه ۱۳۶۹؛ صفحات ۸۴ و ۲۰ تا ۲۲.
- 9- شهدپور علی اصغر. بررسی فاسیولیازیس انسانی و میزبانهای واسطه آن در ایران. دومین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان ۱۳۷۲. صفحه ۶۴.
- 10- Theodore E. Schistosomiasis and other trematodes infection. In: Braunwald, Fauci, kasper, editors. *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 14th ed. 1998; Mc GrawHill, Vol 2, p: 1223.
- 11- Arjona R, Riancho JA, Aguado J, Saleo M. Fascioliasis in developed countries: A review of classic and aberrant forms of the disease. *Medicine* 1998; 74(1): 3-23.
- 12- Diaza A. Identification of *Fasciola hepatica* immunogens by western blot. *Rev Cuba Med Trop* 1998; 1207.
- 13- Jones EA, Kay JM, Milligan HP, Owens D. Massive infection with *Fasciola hepatica* in men. *Am J Med* 1977; 63: 836-42.