

بررسی میزان شیوع عفونتهای کمپیلوباکتریائی در کودکان مبتلا به اسهال در دو بیمارستان تهران و تعیین مقاومت داروئی سویه های جدا شده، ۸۳-۱۳۸۲

محمد مهدی فیض آبادی، سمانه دولت آبادی، سیاوش سلمانزاده، ساناز معز اردلان، علی جاراللهی، محمد رضا زالی*

* مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: در بین عوامل اسهال، کمپیلوباکترها از پاتوژنهای مهم در بروز گاستروانتریت در بسیاری از کشورهای جهان می باشند. بررسی نقش احتمالی کمپیلوباکترها در اسهال کودکان بستری در بیمارستان مفید و مرکز طبی کودکان و سنجش مقاومت سویه های جدا شده از اهداف این مطالعه می باشد.

روش بررسی: در فاصله زمانی مهرماه ۱۳۸۲ تا مهرماه ۱۳۸۳، تعداد ۵۰۰ نمونه مدفوع از دو بیمارستان مذکور در محیط کروی بلر به آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش منتقل و در محیط بروسلا آگار حاوی مکملهای آنتی بیوتیکی کشت داده شد. شناسائی کلنی های مشکوک با استفاده از آزمایشات بیوشیمیائی و حساسیت داروئی آنها با استفاده از روش کربی بائر و دیسکهای حاوی آنتی بیوتیک انجام گردید.

یافته ها: تعداد ۳۹ مورد کمپیلوباکتر از اطفال مبتلا به اسهال جدا گردید (۷/۸٪) که ۵ عدد از آنها در کشت مجدد رشد نکردند. کمپیلوباکتر ژرونی گونه غالب بود (۶۶/۷٪). میزان حساسیت کمپیلوباکترها به آنتی بیوتیکهای مختلف نیز به ترتیب زیر بود: جنتامایسین، ایمی پنم و کلیسیتین (۱۰۰٪)، استرپتومایسین و کلرامفنیکل (۹۷٪) و نئومایسین (۹۴/۱٪)، آمپی سیلین (۸۸/۲٪)، اریترومایسین (۸۵/۲٪)، تتراسیکلین (۷۰/۵٪)، سفوناکسیم (۵۸/۸٪)، کربنی سیلین (۵۰٪)، سفتازیدیم (۳۲/۳٪) و سیپروفلوکساسین (۲۰/۵٪). تمامی سویه های جدا شده به سفالکسین مقاوم بودند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه اخیر نشان می دهد که کمپیلوباکترها بعنوان یکی از عوامل جدی اسهال در اطفال مطرح می باشند و با توجه به مشکلات مربوط به کشت و جداسازی، در نمونه های اسهال کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. مقاومت بسیار بالای سویه های کمپیلوباکتر ایران نسبت به کینولونها هشدار دهنده بوده و باید اقدام پیشگیرانه در این خصوص به عمل آید.

واژگان کلیدی: اسهال حاد کودکان، کمپیلوباکتر، مقاومت داروئی، کینولونها.

مقدمه

سالانه تعداد زیادی از مراجعین به مراکز درمانی در سراسر دنیا را مبتلایان به اسهال تشکیل می دهند که این مسئله موجب صرف امکانات اقتصادی و نیروی متخصص برای مراقبت و درمان مبتلایان و خسارتهای ناشی از آن می گردد.

در بین عوامل اسهال، کمپیلوباکترها از پاتوژنهای مهم بوده و موجب عفونتهای گاستروانتریتی در بسیاری از کشورهای جهان می شوند (۱،۲). بیماری بیشتر در کودکان شایع بوده و نقطه اوج آن در اطفال کمتر از یکسال و یا کودکان زیر ۵ سال گزارش شده است، بطوریکه کمپیلوباکترها در ۱۵-۲/۹٪ موارد اسهال اطفال در کشورهای مختلف نقش داشته اند (۳). بر اساس همین تحقیقات، کمپیلوباکتر حتی بیش از شیگلا سبب اسهال در کودکان شده و این عفونت بیشتر در اثر کمپیلوباکتر ژرونی و کمپیلوباکتر کلی صورت می گیرد (۴).

آدرس نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دکتر محمد رضا زالی. (e-mail: zali@rcgld.org)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۳/۱۱/۱۴

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۴/۴/۲۷

روشهای باکتریولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب بیمارستانها بر اساس قرار گرفتن آنها در مناطق مختلف شهر و پذیرش اطفال انجام شد.

بررسی باکتریولوژی نمونه های بالینی: کلیه نمونه ها در اسرع وقت در محیطهای بروسلا آگار خوندار حاوی مکمل آنتی بیوتیکی (Vancomycin 20 mg, polymyxin 0.5 mg, trimethoprim 1mg/ml) و محیط اختصاصی کمپیلوباکتر حاوی ساپلیمنت همراه با خون دفیبرینه گوسفند (۷٪) کشت داده شدند. در روش غنی سازی (Enrichment) برای کمپیلوباکتر از محیط پرستون برات حاوی ساپلیمنت و خون دفیبرینه گوسفند (۷٪) استفاده شد. در این روش ابتدا نمونه به مدت ۲۴ ساعت در شرایط میکروآتروفیلیک (O_2 ۵٪، CO_2 ۱۰٪ و N_2 ۸۵٪) انکوبه شده و سپس در سطح پلیت حاوی پرستون آگار کشت و در دمای ۴۲ درجه به مدت ۴۸ ساعت و مجدداً در شرایط میکروآتروفیل گرمخانه گذاری شدند. بدلیل حساس بودن کمپیلوباکتر، بهبود شرایط جداسازی و کشف بیشتر موارد مثبت، علاوه بر محیط کری بلر، از محیط غنی کننده پرستون برات نیز برای انتقال نمونه استفاده شد. همچنین محیط اختصاصی کمپیلوباکتر (Difco) حاوی سرم اسب نیز به عنوان مقایسه در کنار خون دفیبرینه گوسفند استفاده گردید.

آزمایشات تعیین هویت سویه ها: تشخیص اولیه کمپیلوباکتر از روی مشاهده کلنی و سپس بوسیله رنگ آمیزی گرم، سافرانین و یا گیمسا انجام شد. پس از تشخیص اولیه، کلنی های مشکوک تجدید کشت شده و آزمایشات بیوشیمیائی با هدف تشخیص جنس و گونه بر روی آنها انجام شد. تستهای انجام شده شامل کاتالاز، اکسیداز، حرکت، هیدرولیز هیپورات، رشد در محیط مک کانکی آگار، مقاومت به دیسک ۳۰ میکروگرمی سفالوتین و حساسیت به دیسک ۳۰ میکروگرمی نالیدیکسیک اسید و تولید SH_2 در محیط TSI بودند (۱۰-۱۲).

تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی: به منظور تعیین حساسیت کمپیلوباکترهای ترموفیل به عوامل ضد میکروبی از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد (۱۳، ۱۲). برای این منظور کلنی های کمپیلوباکتر به محیط مولر هینتون برات تلقیح شده تا سوسپانسیون میکروبی با کدورت ۰/۵ مک فارلند حاصل شود. سپس از این سوسپانسیون در محیط مولر هینتون آگار کشت داده و پس از تلقیح دیسکهای حاوی افلاکساسین، نالیدیکسیک اسید، سفوتاکسیم، سفنازیدیم، جنتامایسین، کربنی سیلین، ایمپی پنم، آمپی سیلین،

عفونتهای کمپیلوباکتریائی از نوع عفونتهای خود محدود شونده است ولی گاهی اوقات باقی مانده و باعث ایجاد عوارض دیررس در شخص می شود (۵). دو عارضه مهم و دیررس عفونت کمپیلوباکتر، آرتریت واکنشی و سندروم گیلن باره هستند. آرتریت واکنشی در یک درصد از افراد مبتلا به عفونت کمپیلوباکتر اتفاق می افتد (۵). این سندرم علل متفاوتی دارد ولی سندرم مرتبط با کمپیلوباکتر دارای پیش آگهی بدتر، بهبود کندتر و نقایص نورولوژیک باقی مانده بیشتری می باشد (۷).

مطالعات انجام شده در ایران اغلب معطوف به جداسازی کمپیلوباکتر از مواد غذایی با منشاء دامی بویژه لاشه مرغ بوده است. میزان آلودگی لاشه های طیور به کمپیلوباکتر را در کشتارگاههای صنعتی تهران تا ۳۳/۳٪ گزارش نموده اند (۸). میزان آلودگی در شهرستانها بیشتر بوده بطوریکه در سال ۱۳۸۱ میزان آلودگی به این باکتری در نمونه های کبد مرغ که از سطح شهر و کشتارگاههای شهر کرد جمع آوری شده بود، ۶۵٪ گزارش کردند (۹).

به دلیل شیوع نسبتاً زیاد موارد اسهال ناشی از کمپیلوباکتر و فقدان واکنش خاص بر علیه این باکتری مساله درمان بوسیله آنتی بیوتیکها مطرح می شود. کمپیلوباکتر مقاوم به آنتی بیوتیک را در موارد متعدد از دامها و عفونتهای انسانی جدا نموده اند که این مسئله درمان را با مشکل مواجه ساخته است (۳، ۱۰). دانستن الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کمپیلوباکتر در درمان صحیح و جلوگیری از گسترش این مقاومتها و ایجاد عوارض بیشتر در بیماران ضروری به نظر می رسد. بنابر این آگاهی از اپیدمیولوژی بیماری و عوامل درگیر در آن به منظور کنترل آن در مناطق مختلف حائز اهمیت می باشد. به همین منظور و نیز به دلیل محدودیت مطالعات انجام شده بر روی کمپیلوباکتریوز انسانی در کشور، این مطالعه بر روی موارد اسهال حاد کودکان بستری در بیمارستانهای تهران از مهر ۱۳۸۲ لغایت مهر ۱۳۸۳ انجام گرفت.

مواد و روشها

در طول مدت مطالعه، تعداد ۵۰۰ نمونه مدفوع از اطفال مبتلا به اسهال در مرکز طبی کودکان (۳۰۲ نمونه) و بیمارستان مفید (۱۹۸ نمونه)، جمع آوری و در محیطهای انتقال (کری بلر و محیط پرستون) در مدت کمتر از ۴ ساعت به آزمایشگاه میکروشناسی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل و با

C. coli تمایل به ایجاد اشکال کشیده تر و یا حتی باسیل مانند دارد.

نتایج حاصل از تعیین حساسیت دارویی سویه های کمپیلوباکتر بصورت زیر است: کلرامفنیکل (۹۷٪)، افلاکساسین (۱۱/۷٪)، سفتازیدیم (۳۲/۳٪)، کلیستین (۱۰۰٪)، سفوتاکسیم (۵۸/۸٪)، نئومایسین (۹۴/۱٪)، جنتامایسین (۱۰۰٪)، آمپی سیلین (۸۸/۲٪)، اریترومایسین (۸۵/۲٪)، سیپروفلوکساسین (۲۰/۵٪)، تتراسیکلین (۷۰/۵٪)، ایمی پنم (۱۰۰٪)، استرپتومایسین (۹۷٪)، کربنی سیلین (۵۰٪) و نالیدیکسیک اسید (۲۰/۵٪). میزان مقاومت نسبت به سفالوتین ۹۱/۱٪ تعیین شد (جدول ۱).

جدول ۱- فراوانی سویه های حساس، مقاوم و دارای حساسیت بینابینی کمپیلوباکتر در کودکان اسهالی

مقاوم	intermediate	حساس	آنتی بیوتیک
۰	۰	۳۴ (۱۰۰٪)*	کلیستین (۱۰ μg)
(۲/۹)۱	۰	۳۳ (۹۷/۱)	کلرامفنیکل (۳۰ μg)
(۲/۹)۱	(۲/۹)۱	۳۲ (۹۴/۲)	نئومایسین (۳۰ μg)
(۵۹)۲۰	(۲۰/۵)۷	۷ (۲۰/۵)	سیپروفلوکساسین (۵ μg)
(۸۸/۲)۳۰	۰	۴ (۱۱/۸)	اوفلوکساسین (۵ μg)
(۲/۹)۱	(۱۱/۸)۴	۲۹ (۸۵/۳)	اریترومایسین (۱۵ μg)
(۱۷/۷)۶	(۱۱/۸)۴	۲۴ (۷۰/۵)	تتراسیکلین (۳۰ μg)
۰	۰	۳۴ (۱۰۰٪)	جنتامایسین (۱۰ μg)
۰	۰	۳۴ (۱۰۰٪)	ایمی پنم (۱۰ μg)
(۵۰)۱۷	(۱۷/۷)۶	۱۱ (۳۲/۳)	سفتازیدیم (۳۰ μg)
(۸/۸)۳	(۳۲/۲)۱۱	۲۰ (۵۹)	سفوتاکسیم (۱۰ μg)
(۲/۹)۱	(۸/۸)۳	۳۰ (۸۸/۲)	آمپی سیلین (۲۵ μg)
۰	(۲/۹)۱	۳۳ (۹۷/۱)	استرپتومایسین (۱۰۰ μg)
(۷۶/۶)۲۶	(۲/۹)۱	۷ (۲۰/۵)	نالیدیکسیک اسید (۳۰ μg)
(۹۱/۳)۳۱	(۲/۹)۱	۲ (۵/۸)	سفالوتین (۳۰ μg)
(۳۵/۳)۱۲	(۱۴/۷)۵	۱۷ (۵۰)	کربنی سیلین (۱۰۰ μg)
(۹۱/۲)۳۱	۰	۳ (۸/۸)	سفالکسین (۳۰ μg)

* اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند

بحث

اسهال ایجاد شده بوسیله کمپیلوباکتر بیشتر ناشی از مصرف غذای آلوده می باشد. غذا پس از طی زنجیره طولانی تولید و توزیع بدست مصرف کننده می رسد و در این مدت انواع باکتریهای فرصت طلب از جمله کمپیلوباکتر ژژونی زمان کافی برای رشد پیدا کرده و در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی سبب آلودگیها و از جمله اسهال می گردند (۷، ۱۴).

در اکثر مطالعاتی که در مورد کمپیلوباکتر در ایران صورت گرفته است نمونه ها محدود به مواد غذایی بوده و مساله

سیپروفلوکساسین، اریترومایسین، کلیستین، تتراسایکلین، سفالوتین، کلرامفنیکل، نئومایسین و استرپتومایسین (ساخت شرکت اکسوئید) قرار داده شده و نتایج پس از ۴۸ ساعت قرائت گردید.

یافته ها

در مجموع از ۵۰۰ بیمار مبتلا به اسهال، ۲۳۵ بیمار مونث (۴۷٪) و ۲۶۵ (۵۳٪) مورد مذكر بودند. میانگین سنی بیماران ۱۴ ماه و محدوده تغییرات آن از ۳ ماه تا ۱۴ سال بدست آمد. پس از کشت اختصاصی، از ۳۹ نمونه کمپیلوباکتر جدا گردید که از بین آنها ۲۶ جدایه (۶۶/۷٪) به گونه *C. jejuni* و ۷ جدایه (۱۷/۹٪) به گونه *C. coli* تعلق داشتند. ۵ سویه نیز در تجدید کشت از بین رفتند و یک سویه کمپیلوباکتر نیز با تستهای بیوشیمیائی شناسائی نشد.

علاوم بالینی مشاهده شده در بیمارانی که در کشت باکتریولوژی از نظر کمپیلوباکتر مثبت بودند عبارت بودند از: درد شکم (۶۶/۶٪)، استفراغ (۶۶/۶٪)، بی اشتها (۶۶/۶٪)، تهوع (۶۲/۵٪)، تب (۵۸/۳٪)، بی حالی (۳۷/۵٪)، اسهال خونی (۲۴/۲٪) و سردرد (۴/۷٪).

همانطور که قبلا اشاره شد هیدرولیز هیپورات یک تست کلیدی برای افتراق *C. jejuni* از سایر گونه های کمپیلوباکتر می باشد. به دلیل استفاده از مکملهای حاوی آنتی بیوتیک در محیط کشت امکان جداسازی سایر گونه های ترموفیل کمپیلوباکتر میسر نشد زیرا بعضی از این گونه ها (*C. upsaliensis*) به این آنتی بیوتیکها حساس می باشند.

از بین کمپیلوباکترهای جدا شده ۱۵/۴٪ سویه ها از بیمارستان کودکان مفید و ۸۴/۶٪ نیز از مرکز طبی کودکان بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده آلودگی در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان بیشتر است. علاوه بر بالا بودن تعداد نمونه های دریافت شده از مرکز طبی کودکان، احتمالا استفاده از محیط غنی کننده پرستون برات در غنی سازی نمونه های دریافت شده از مرکز طبی کودکان در افزایش میزان جداسازی کمپیلوباکتر نیز نقش داشته است.

در آزمایشات بیوشیمیائی تفاوتی بین دو گونه *C. jejuni* و *C. coli* مشاهده گردید. عدم توانائی *C. coli* در هیدرولیز هیپورات بدلیل نداشتن آنزیم هیپوریکاز برجسته ترین تفاوت مشاهده شده می باشد. همچنین کشت باکتری در شرایط اکسیداتیو و دمای اتاق باعث دژنره شدن باکتری و ایجاد اشکال متفاوت در هریک از این دو گونه می گردد. بر اساس نتایج حاصل *C. jejuni* تمایل به ایجاد اشکال کوکوئیدی و

مقاومتهای آنتی بیوتیکی در آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. در مطالعه حاضر بمدت یکسال دو بیمارستان تخصصی کودکان در شهر تهران تحت پوشش قرار گرفت.

بررسی مقایسه ای بروسلا آگار با محیط اختصاصی کمپیلوباکتر حاوی سرم اسب نشان داد که کلنی های کمپیلوباکتر بر روی محیط بروسلا آگار حاوی خون دفیبرینه گوسفند مشخصتر و در نتیجه شناسائی آنها آسانتر می باشد. در صورتی که در محیط اختصاصی کمپیلوباکتر به علت بی رنگ بودن، کلنی ها به سختی مشاهده و تشخیص داده می شدند. با کشت نمونه های موجود در محیط پرستون برات بر روی پرستون آگار نیز نتایج خوبی حاصل گردید. در این محیط نیز کلنی های کمپیلوباکتر شناسائی شدند. ضمناً از کشت نمونه های غنی شده در پرستون برات بر روی پرستون آگار نتایج بهتری حاصل گردید.

در این تحقیق ۳۹ نمونه مثبت (۷/۸٪) جداسازی شد که از این تعداد ۱۰ مورد فقط مربوط به نمونه هائی بود که قبل از کشت مرحله غنی سازی در محیط پرستون بر روی آنها انجام شده بود. ۲۵ نمونه مثبت نیز از نمونه های حمل شده توسط محیط کری بلر بدست آمد. ۴ نمونه مثبت نیز با هر دو نوع محیط کری بلر و پرستون پاسخ مثبت دادند. این امر بیانگر این است که با توجه به رشد سخت و حساس بودن کمپیلوباکتر استفاده از محیطهای غنی کننده (در کنار محیط انتقال کری بلر) در حفظ و جداسازی کمپیلوباکتر از موارد اسهال حاد بسیار موثر است. لذا استفاده از محیط غنی کننده برای جداسازی هرچه بیشتر کمپیلوباکتر در نمونه های بالینی موکدا توصیه می گردد. همچنین از موارد مثبت بدست آمده یک مورد از محیط پرستون برات فاقد خون بدست آمد که این امر بدلیل بالا بودن میزان آلودگی خون در کشورهای جهان سوم و قابل استفاده بودن محیط فاقد خون حائز اهمیت می باشد (۱۵).

در گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شده است الگوی فراوانی این باکتری در کشور ایالات متحده آمریکا را ۲۳/۵ در ۱۰۰۰۰۰ عنوان نموده است که البته به نظر می رسد این آمار همه موارد واقعی را شامل نشود زیرا تنها بخشی از بیماران مبتلا به کمپیلوباکتریوزیس به مراکز درمانی مراجعه می کنند و سایر موارد تحت بررسی قرار نمی گیرند (۱۶). در بررسی دیگری که در ۱۱ منطقه ایالات متحده صورت گرفت کمپیلوباکتر را در ۶/۲٪ از موارد اسهال خونی جدا کردند (۶)، (۳). اروپای شمالی نیز تعداد موارد تأیید شده کمپیلوباکتریوزیس را در انسان بین ۶۰ تا ۹۰ در ۱۰۰۰۰۰

نفر جمعیت گزارش نموده و تخمین زده می شود که میزان واقعی آن ۲۳۰۰-۱۰۰۰ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت باشد (۳). در کشورهای آسیای جنوب شرقی عفونتهای کمپیلوباکتریائی در کودکان کمتر از یک سال و یا کودکان زیر ۵ سال به اوج خود رسیده و شیوع آن را در این محدوده سنی بین ۲/۹ تا ۱۵٪ برآورد نموده اند (۳). در تحقیق حاضر نیز کمپیلوباکتر بیشتر از کودکان زیر ۲ سال جدا شد و حدود ۱۹ مورد از کمپیلوباکترهای جدا شده به این گروه سنی تعلق داشتند. با توجه به نتایج و میزان جداسازی کمپیلوباکتر در مطالعه حاضر، بنظر می رسد که میزان شیوع واقعی عفونت در جامعه بسیار بیشتر از ۷/۸٪ باشد.

در تحقیق حاضر حساسیت آنتی بیوتیکی کمپیلوباکترهای جدا شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۷۸/۵٪ از سویه های کمپیلوباکتر به اریترومیسین حساس می باشند. این مسئله با توجه به انتخابی بودن اریترومیسین در درمان عفونتهای کمپیلوباکتر حائز اهمیت بوده و در مقایسه با مطالعات انجام یافته در سایر کشور ها بالا می باشد (۱۰). همچنین مقاومت کمپیلوباکترها نسبت به کینولونها (اسید نالیدیکسیک) و فلوروکینولونها (سیپروفلوکساسین) بدلیل اینکه آنها غالباً برای درمان عفونتهای دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرند، باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق ۷۸/۵٪ کمپیلوباکترها نسبت به نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند که این مقاومت در مورد سیپروفلوکساسین ۶۴/۳٪ تعیین گردید. همچنین مقاومت تقاطعی بین نالیدیکسیک اسید و سیپروفلوکساسین بررسی شد که بجز ۶ سویه همگی این نوع مقاومت را نشان می دادند. میزان مقاومت به این دسته از آنتی بیوتیکها در مقایسه با مطالعه ای که اخیراً در دانمارک صورت گرفته، بالا بوده و می تواند بدلیل مصرف آنها در زنجیره غذایی و بهداشتی دام و طیور در کشور باشد. زیرا دانمارکی ها با محدود نمودن مصرف کینولونها توانسته اند سبب کاهش فوق العاده سویه های کمپیلوباکتر مقاوم به سیپروفلوکساسین از صنعت طیور در این کشور شوند (۱۷). بالا بودن میزان مقاومت به کینولونها در سویه های ایرانی کمپیلوباکتر همچون سایر کشورها می تواند عارضه افزایش مدت بستری شدن در بیمارستان (۱۳/۲ روز) در مقایسه با بیماران گرفتار به سویه های حساس (۱۰/۳ روز) را در پی داشته باشد که البته مسئله استفاده از فلوروکینولونها در درمان اطفال بیمار منتفی است.

تمامی سویه های کمپیلوباکتر جدا شده در این بررسی نسبت به ایمی پنم و جنتامایسین حساس بودند. لذا از این دو

تهران بیشتر توجه نمود تا از بروز مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله از مساعدت و همکاری کلیه کارکنان آزمایشگاه مرکز تحقیقات گوارش بویژه خانمها هاله عدالتخواه، معصومه عظیمی، فرشته جعفری و غفت حبیبی کمال تشکر و قدردانی را می نمایند.

آنتی بیوتیک می توان برای درمان عفونتهای سیستمیک ناشی از کمپیلوباکتر استفاده نمود (۶). همچنین کلیه سوبه های کمپیلوباکتر ژژونی در این بررسی به اریترومایسین حساس بودند. بر این اساس و با در نظر گرفتن شرایط بیمار می توان از این دارو برای درمان موارد اسهال حاد ناشی از کمپیلوباکتر استفاده نمود.

بر اساس اطلاعات حاصل از این تحقیق به نظر می رسد که باید به نقش کمپیلوباکتر در ایجاد اسهال حاد در کودکان

REFERENCES

- Linton D, Lawson AJ, Owen RJ, Stanley J. PCR detection, identification to species level, and fingerprinting of *Campylobacter jejuni* and *Campylobacter coli* direct from diarrheic samples. *J Clin Microbiol* 1997;35:2568-72.
- Merino FJ, Agulla A, Villasante PA, Diaz A, Saz JV, Velasco AC. Comparative efficacy of seven selective media for isolating *Campylobacter jejuni*. *J Clin Microbiol* 1986;24:451-2.
- Padungton P, Kaneene JB. *Campylobacter* spp in human, chickens, pigs and their antimicrobial resistance. *J Vet Med Sci* 2003;65:161-70.
- Torres ME, Pirez MC, Schelotto F, Varela G, Parodi V, Allende F, et al. Etiology of children's diarrhea in Montevideo, Uruguay: associated pathogens and unusual isolates. *J Clin Microbiol* 2001;39:2134-9.
- Talan D, Moran GJ, Newdow M, Ong S, Mower WR, Nakase JY, et al. Etiology of bloody diarrhea among patients presenting to United States emergency departments: prevalence of *Escherichia coli* O157:H7 and other enteropathogens. *Clin Infect Dis* 2001;32:573-80.
- Borleffs JC, Schellekens JF, Brouwer E, Rozenberg-Arska M. Use of an immunoglobulin M containing preparation for treatment of two hypogammaglobulinemic patients with persistent *Campylobacter jejuni* infection. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1993;12:772-5.
- On SL, Jordan PJ. Evaluation of 11 PCR assays for species-level identification of *Campylobacter jejuni* and *Campylobacter coli*. *J Clin Microbiol* 2003;41:330-6.
- امیر رسولی ه، رجیبی ع، کامبخش ب، ولانی ن. بررسی شیوع آلودگی به کمپیلوباکتر در مرغان کشتارگاههای صنعتی شهر تهران. مجله پژوهش در پزشکی، ۱۳۷۶؛ سال ۲۱، شماره ۱، صفحات ۱۳-۷.
- شاکریان ا، شریف زاده ع، رکنی ن، طالبیان ر. بررسی شیوع کمپیلوباکتر ژژونی در کبد طیور کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی طیور و فروشگاههای عرضه کننده گوشت طیور در شهر کرد. خلاصه مقالات ارائه شده در ششمین کنگره سراسری میکروبیشناسی ایران. ۲۹-۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۲، تهران.
- Aarestrup FM, Nielsen EM, Madsen M, Engberg J. Antimicrobial susceptibility patterns of thermophilic *Campylobacter* spp. from humans, pigs, cattle, and broilers in Denmark. *Antimicrob Agents Chemother* 1997;41:2244-50.
- Engberg J, On SL, Harrington CS, Gerner-Smidt P. Prevalence of *campylobacter*, *arcobacter*, *helicobacter*, and *sutterella* spp. in human fecal samples as estimated by a reevaluation of isolation methods for *campylobacter*. *J Clin Microbiol* 2000;38:286-91.
- Tremblay C, Gaudreau C, Lorange M. Epidemiology and antimicrobial susceptibilities of 111 *campylobacter* fetus subsp. fetus strains isolated in Quebec, Canada, from 1983 to 2000. *J Clin Microbiol* 2003;41:463-6.
- Moore JE, Crowe M, Heaney N, Crothers E. Antibiotic resistance in *campylobacter* spp. isolated from human faeces (1980-2000) and foods (1997-2000) in Northern Ireland: an update. *J Antimicrob Chemother* 2001;48:455-7.
- Tauxe RV. Emerging foodborne diseases: an evolving public health challenge. *Emerg Infect Dis* 1997;3:425-34.
- Goossens H, De Boeck M, Coignau H, Vlaes L, Van den Borre C, Butzler JP. Modified selective medium for isolation of *Campylobacter* spp. from feces: comparison with Preston medium, a blood-free medium, and a filtration system. *J Clin Microbiol* 1986;24:840-3.

16. Freidman CR, Neimann J, Wegerner HC, Taaxe RV. Epidemiology of *Campylobacter jejuni* infections in the United States and other industrialized nations. In: Nachamkin I, Blaser MJ, editors. *Campylobacter*. 2nd edition, American Society for Microbiology, Washington DC, 2000; p:121.
17. Engberg J, Neimann J, Nielsen EM, Aerestrup FM, Fussing V. Quinolone-resistant campylobacter infections: risk factors and clinical consequences. *Emerg Infect Dis* 2004;10:1056-63.