پژوهش درپزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دوره ۳۰، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۵، صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۹

مقاله اصلی
(Original Article)

بررسی فراوانی تظاهرات پوستی در ۱۱۳۵ بیمار دیابتی نوع دو در شهر تهران و ارتباط آن با عوارض میکروواسکولر دیابت

دکتر محبوبه‌السادات حسینی، دکتر امیرهوشنگ احسانی، دکتر فرهاد حسین‌پناه، دکتر فریدون عزیزی *

* مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: *بیماران دیابتی از انواع وسیعی از ضایعات پوستی رنج می‌برند و مطالعات قبلی شیوع‌های متفاوتی را گزارش کرده‌اند. مطالعه کنونی فراوانی تظاهرات پوستی را در ۱۱۳۵ بیمار دیابتی نوع ۲ و ارتباط آن با عوارض میکروواسکولر را بررسی کرده است.*

روش بررسی: *در این مطالعه مقطعی ۱۱۳۵بیمار دیابتی نوع ۲ که به طور مستمر به انجمن دیابت ایران و برخی از کلینیک‌های پوست و درمانگاههای غدد مراجعه کردند از نظر تظاهرات پوستی تحت معاینه کامل قرار گرفتند و در موارد لازم کشت، اسمیر و بیوپسی به عمل آمد. فشارخون، قد و وزن اندازه‌گیری شد و وجود نوروپاتی به روش Michigan neuropathy screening instrument ارزیابی شد. بررسی رتینوپاتی توسط متخصص چشم انجام گردید. از کلیه بیماران FBS، HbA_1c و آلبومینوری سنجیده شد.*

یافته‌ها: *در این مطالعه ۱۱۳۵ بیمار دیابتی شامل ۵۱۶ مرد (۴۵٪) و ۶۱۹ زن (۵۵٪) با میانگین سنی ۱۱±۵۴ سال و میانگین مدت زمان ابتلا به دیابت ۷±۹ سال وارد شدند. شیوع تظاهرات پوستی ۶۴٪ بود. میانگین سنی، مدت زمان ابتلا به دیابت، رتینوپاتی و نوروپاتی در بیمارانی که ضایعه پوستی داشتند به طور معنی‌داری بالاتر بود. شایعترین تظاهر پوستی منفرد درموپاتی دیابتی، با شیوع ۳۲/۳٪ بود ولی مجموعه عفونتهای پوستی در ۴۱/۵٪ بیماران دیده شد. آکانتوزیس نیگریکانس شیوع ۲۶/۴٪ داشت.*

نتیجه‌گیری: *شیوع ضایعات پوستی در بیماران نوع دو دیابت بالاست. برخی از آنها مؤید وجود عوارض میکروواسکولر و برخی موید عدم کنترل مناسب قند خون هستند.*

واژگان کلیدی: *تظاهرات پوستی، دیابت نوع دو، عوارض میکروواسکولر.*

مقدمه

دیابت یک گروه از بیماریهای متابولیک است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص ترشح انسولین، عمل انسولین و یا هر دو مشخص می‌شود و نوع دو دیابت شایعترین فرم بیماری است(۱). این بیماری می‌تواند بر تمام سیستم‌های بدن از جمله پوست اثر بگذارد (۲). تظاهرات پوستی دیابت را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: بیماریهای پوستی با ارتباط ضعیف تا قوی با دیابت (نکروبیوزیس لیپوئیدیکا، درموپاتی دیابتی، بول دیابتی، زردی پوست، اراپتیو زانتوما، درماتوز پرفوران، آکانتوزیس نیگریکانس، لکوپلاکی دهانی و لیکن پلان)، عفونتها (باکتریال یا قارچی)، تظاهرات پوستی ناشی از عوارض دیابت (میکروآنژیوپاتی، ماکروآنژیوپاتی و نوروپاتی) و عوارض پوستی ناشی از درمان دیابت (سولفین اوره و انسولین) (۳).

در اکثر مطالعات تظاهر پوستی در هر دو نوع دیابت بررسی شده و مطالعات کمی شیوع تظاهرات پوستی را در نوع دو دیابت بررسی کرده‌اند (۵،۴). تظاهرات پوستی در بیماران دیابتی شایع بوده و به شکلهای مختلفی تظاهر می‌یابند و اگر اثرات متابولیک را در جریان خون عروق کوچک و تغییرات ایجاد شده در کلاژن را در نظر بگیریم شیوع تظاهرات پوستی در بیماران دیابتی به ۱۰۰ درصد می‌رسد (۶). در مطالعات

آدرس نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دکتر محبوبه‌السادات حسینی **(email:** mahb_hosseini@yahoo.com)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۵/٤/۱۱
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۵/۳

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]

قبلی هم شیوع‌های متفاوتی از تظاهرات پوستی گزارش شده است ولی تعداد بیماران در اکثر آنها کافی نبوده و هیچ یک از آنها ارتباط تظاهرات پوستی با عوارض میکرووواسکولر و متغیرهای دیگر مثل سن، جنس، HbA_1c، مدت زمان ابتلا و نوع درمان دیابت را بررسی نکرده‌اند. در ایران نیز تاکنون مطالعه‌ای بر روی حجم وسیعی از بیماران دیابتی نوع دو انجام نشده است. این مطالعه به منظور بررسی شیوع تظاهرات پوستی در بیماران نوع دو دیابت و ارتباط آن با عوارض میکرووواسکولر دیابت، HbA_1c، میانگین سنی، جنس، نوع درمان (BMI (Body mass index، و مدت زمان ابتلا به دیابت انجام گردید.

مواد و روشها

این یک مطالعه مقطعی است که در سال ۱۳۸۴در تهران انجام شده است. با توجه به این که از جمله ناشایع‌ترین ضایعات پوستی دیابتی، تاول دیابتی با شیوع ۵/۶٪ است با d=۰/۲p و α=٪۱۰ حجم نمونه معادل ۱۱۳۵ نفر محاسبه گردید. جامعه مورد بررسی بیماران دیابتی نوع ۲ بودند که به طور مستمر به انجمن دیابت ایران، کلینیک‌های پوست و کلینیک‌های غدد مراجعه می‌کردند. کلیه بیماران توسط یک متخصص پوست از جهت تظاهرات پوستی مرتبط با دیابت، تظاهرات پوستی ناشی از عفونتها و تظاهرات پوستی ناشی از درمان دیابت به طور کامل معاینه شدند و در مورد تظاهرات پوستی متفرقه تنها ضایعات پوستی که مورد شکایت بیمار بودند، معاینه شدند. تشخیص قطعی نکروبیوزیس لیپوئیدیکا، اسکلروادما، درماتوز پرفوران، گرانولوم آنولر، گزانتوم و تاول دیابتی با بیوپسی داده شد و جهت تأیید تشخیص عفونتهای پوستی از کشت و اسمیر استفاده شد. سپس بیماران توسط دستیار فوق تخصصی غدد از جهت فشار خون، قد، وزن و معاینه عصبی(به روش Michigan neuropathy screening instrument) تحت معاینه قرار گرفتند و امتیاز بالای ۲ دال بر وجود نوروپاتی اطلاق شد (۷). از جهت رتینوپاتی کلیه بیماران به متخصص چشم ارجاع شدند و طبق نامه‌ای کتبی از پزشک مربوطه Stage درگیری چشم شامل تغییرات غیرپرولیفراتیو و پرولیفراتیو درخواست شد. که با افتالموسکوپی غیرمستقیم و با مردمکهای گشاد ارزیابی شد. جهت بررسی آلبومینوری، ابتدا سعی گردید که کلیه عواملی که باعث آلبومینوری گذرا می‌شود، در حد امکان رفع گردد (عفونت ادراری، فشار خون شدید، هیپرگلیسمی شدید، ورزش و تب حاد) و اگر این عوامل قابل مرتفع شدن نبود، بیمار از جهت آلبومینوری بررسی نمی‌شد. در غیر این صورت از بیمار یک نمونه ادرار صبحگاهی جهت سنجش آلبومین و کراتینین گرفته شده و نسبت آلبومین به کراتینین محاسبه گردید. همزمان با انجام این آزمایش FBS و HbA_1c هم اندازه‌گیری شد. جهت تعیین ارتباط تظاهرات پوستی با HbA_1c، تنها ارتباط HbA_1c با تظاهرات پوستی که از زمان ظهور آنها تا زمان مطالعه ما کمتر از ۳ ماه فاصله بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. کلیه اطلاعات فوق در پرسشنامه‌ای ثبت گردید.

کلیه آزمایشات در یک آزمایشگاه انجام گردید و اگر میزان آلبومینوری و HbA_1c به ترتیب در طی یکسال و سه ماهه اخیر سنجیده شده بود، تکرار نمی‌شد.

نسبت آلبومین به کراتینین با واحد mg/gr و با روش Turbitimer مربوط به شرکت Bring سنجیده شد و اگر میزان آن بالاتر از ۳۰mg/gr بود به عنوان وجود آلبومینوری، تلقی شد. HbA_1c با روش LPLC اندازه‌گیری شد. در هر دو آزمایش فوق Interassay cv معادل ۳ درصد و Intra assay cv معادل ۲ درصد بود.

اطلاعات جمع‌آوی شده در پرسشنامه‌ها بعد از کدبندی وارد نرم‌افزار SPSS (Version 11) گردید. جهت تعیین اختلاف بین متغیرهای کمی از t test استفاده شد و به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شد و برای تعیین اختلاف بین متغیرهای کیفی از Chi square test استفاده شد و به صورت درصد، نشان داده شد. جهت ارزیابی نقش متغیرهای مختلف در ایجاد ضایعات پوستی از مدل Logestic regression استفاده شد و در این مدل متغیر وابسته ضایعات پوستی مرتبط با دیابت تعریف شد و متغیرهای مستقل، شامل سن، جنس، HbA_1c، نوع درمان، BMI، نوروپاتی، رتینوپاتی و مدت زمان ابتلا بود. مقادیر $p<۰/۰۵$ معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها

میانگین سنی افراد مورد مطالعه۱۱±۵۴ سال بود که ۶۱۹ نفر (٪۵۵) زن و ۵۱۶ نفر (٪۴۵) مرد بودند. مدت زمان ابتلا ۷±۹ سال بود. ۹۱۳ بیمار (٪۸۲) از داروهای پایین‌آورنده قندخون، ۱۶۲ بیمار (٪۱۴) از انسولین و ۳۴ بیمار (٪۳) از هر دو استفاده می‌کردند. میانگین HbA_1c، ۱/۶±۷/۸ بود. میانگین سنی بیمارانی که ضایعه پوستی داشتند ۷±۱۰ سال بود که در مقایسه با گروه غیرمبتلا بالاتر بود ($p<۰/۰۵$). میزان نوروپاتی و رتینوپاتی هم در بیماران مبتلا به ضایعه پوستی نسبت به گروه غیرمبتلا بالاتر بود. درصد مردان مبتلا نسبت

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]

بـه زنـان مبـتلا بـالاتر بـود (p<۰/۰۵)(جـدول ۱). شیـوع تظاهـرات پوستـی ۶۴٪ بود. اکثـر ضـایعات پوسـتی بعـد از تشخیص دیابت ایجـاد شـده بودنـد (۹۱٪). ۵۹ بیمـار ضـایعه پوسـتی را قبـل از دیابـت داشـتند (۴۰ بیمـار بـا آکـانتوزیس نیگریکانس، ۴ بیمار بـا فولیکولیـت، ۶ بیمـار بـا اینترتریگـوی کاندیدیایی، ۶ بیمـار بـا اریتراسـما، ۲ بیمـار بـا نکروبیـوزیس لیپوئیدیکا و ۱ بیمار با گرانولـوم آنـولر). تعـداد کـل ضـایعات ۱۸۳۳ عدد بود و ۷۰٪ بیمـاران بـیش از یـک ضـایعه پوسـتی داشتند.

جدول ۱- مشخصات افراد شرکت‌کننده در مطالعه و مقایسه آنها بین بیماران با و بدون ضایعه پوستی

متغیر		کل افراد مورد مطالعه	بیماران با ضایعه پوستی	بیماران بدون ضایعه پوستی
سن (سال)		۵۴±۱۱	۵۵±۱۱[¶]	۵۱±۶
جنس	زن	۶۱۹(۵۵)[*]	۳۵۳(۴۸)[¶]	۲۶۶(۶۴)
	مرد	۵۱۶(۴۵)	۳۷۰(۵۲)	۱۴۶(۳۶)
[*]مدت زمان ابتلا (سال)		۹±۷	۱۰±۷[¶]	۷±۷
[†]سابقه خانوادگی دیابت		۸۲۷(۷۳)	۵۳۵(۷۴)	۲۹۲(۷۳)
نمایه توده بدنی kg/m^2		۲۷±۴	۲۸±۳	۲۷±۳
داروی[‡]	داروی پایین آورنده قند خون	۹۱۳(۸۲)	۵۷۶(۸۱)	۳۳۷(۸۴)
	انسولین	۱۶۲(۱۴)	۱۱۱(۱۵)	۵۱(۱۲)
	هر دو	۳۴(۳)	۲۳(۳)	۱۲(۳)
HbA1c(درصد)		۷/۸±۱/۶	۷/۸±۱/۶	۷/۷±۱/۷
رتینوپاتی		۳۹۷(۳۵)	۲۷۶(۳۸)[¶]	۱۲۱(۲۹)
نوروپاتی		۶۴۳(۵۷)	۴۶۲(۶۴)[¶]	۱۸(۴۴)
آلبومینوری		۲۹۳(۲۷)	۱۷۷(۲۶)	۱۱۶(۲۹)
جمع		۱۱۳۵	۷۲۳(۶۴)[**]	۴۱۲(۳۶)

* مدت زمان ابتلا: مدت زمانی که از تشخیص دیابت می‌گذرد.
† سابقه خانوادگی: پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر
‡۲۱ بیمار هیچ دارویی مصرف نمی‌کردند
¶ p<۰/۰۵ در مقایسه با بیمارانی که ضایعه پوستی نداشته‌اند به جز جنسیت که مقایسه زنان و مردان مبتلا به ضایعه پوستی است
** حدود اطمینان ۹۵ درصد: ۷۹-۵۸
- در ۶۷ بیمار میکروآلبومینوری بدلیل عفونت ادراری مقاوم به درمان (۲بیمار) نارسایی قلبی (۲ بیمار). فشار خون بالا و هایپرگلیسمی قابل توجه سنجیده نشد.

در ایـن مطالعـه شـایعترین ضـایعه پوسـتی منفـرد درموپـاتی دیابتی با شـیوع ۳۲/۳٪ بـود ولـی ضـایعات پوسـتی ناشـی از عفونتها در ۳۰۰ بیمار (۴۱/۵٪) دیده شد کـه در ایـن صـورت شایعترین تظاهر پوستی خواهد بـود. آکـانتوزیس نیگریکـانس سومین ضایعه پوستی شایع می‌باشد (جدول ۲).

جدول ۲- فراوانی تظاهرات پوستی

تظاهرات پوستی مرتبط با دیابت	فراوانی(درصد)
درموپاتی دیابتی	۳۶۷(۳۲/۳)
آکانتوزیس نیگریکانس	۳۰۰(۲۶/۴)
زخم پای دیابتی	۷۷(۶/۸)
گرانولوم آنولر ژنرالیزه	۳۵(۳/۱)
قرمزی صورت	۱۸(۱/۶)
تاول دیابتی	۱۰(۰/۸)
درماتوز پرفوران	۶(۰/۵)
اسکلروادما	۶(۰/۵)
نکروبیوزیس لیپوئیدیکا	۵(۰/۴)
[*]گزانتوم	۳(۰/۲۷)
تغییرات اسکلرودرمی دستها	۱(۰/۸)
جمع کل	۸۲۸(۷۳)
تظاهرات پوستی ناشی از عفونتها	
تینه آپدیس	۱۳۷ (۱۲)[*]
اریتراسما	۱۳۵(۱۱/۸)
تینه آورسیکالر	۱۳۱(۱۱)
پارونی شیای کاندیدیایی	۱۰۱(۸/۸)
[†]درماتوفیت ناخن	۹۰(۷/۹)
[‡]پیودرما	۷۶(۶/۷)
اینترتریگوی کاندیدیایی	۶۱(۵/۴)
جمع کل	۷۳۱(۶۴)
ضایعات پوستی ناشی از درمان	
لیپوهایپرتروفی	۴(۰/۳)
لیپوهایپوتروفی	۲(۰/۱)
جمع کل	۶(۰/۵)
تظاهرات پوستی متفرقه	
خارش	۹۷ (۸/۵)[*]
درماتوز پیگمانته پورپورا|یک	۵۰(۴/۴)
درماتیت تماسی	۴۷(۴/۱)
لیکن پلان	۲۳(۲)
ویتیلگو	۲۳(۲)
پسوریازیس	۲۰(۱/۷)
کلوئید	۲(۰/۱)
درماتیت آتوپیک	۶(۰/۵)
جمع کل	۲۶۸(۲۴)

* هر سه بیمار مبتلا به گزانتوم mg/dl ۱۰۰۰ < تری گلیسرید داشتند و نوع آنها eruptive بود
† ۱۳۷ بیمار (۱۲ درصد) دیستروفی ناخن داشتند که بعد از انجام اسمیر و کشت ناخن، ۹۰ بیمار درماتوفیت و ۱۰ بیمار کاندیدا داشتند و در ۳۰ بیمار اسمیر و کشت منفی بود و ۷ بیمار هم اسمیر و کشت را انجام ندادند.
‡پیودرما شامل فولیکولیت، فرونکل و کربانکل

لیپوهیپرتروفی در ناحیه شکم و ران و لیپوهیپوتروفی در ناحیه شکم دیده شد و هیچ‌گونه حساسیت پوستی نسبت به انسولین و یا داروهای پایین‌آورنده قند خون مشاهده نشد.

تنها ۸٪ ضایعات پوستی در فاصله زمانی کمتـر از یـک‌سـال از زمان تشخیص دیابت ظاهر شدند ولی ۴۹٪ از ضایعات پوستی آکانتوزیس نیگریکانس در زیر یک‌سال از زمان تشخیص دیابت

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]

ایجاد شده بودند که نسبت به ظهور درموپاتی دیابتی در این فاصله زمانی (۶٪) به طور معنی‌داری بالاتر بود. در بیمارانی که زخم پای دیابتی، درموپاتی دیابتی و تینه‌آپدیس داشتند شیوع نوروپاتی، رتینوپاتی و آلبومینوری به طور معنی‌داری بالاتر از گروه غیر مبتلا به این ضایعات بود.

شیوع نوروپاتی در بیمارانی با قرمزی صورت، پیودرما، تینه‌آپدیس، درماتوفیت ناخن، پارونیشیای کاندیدیایی و در بیماران مبتلا به خارش به طور معنی‌داری بالاتر بود. همه بیماران مبتلا به لیپوهیپرتروفی و لیپوهیپوتروفی، رتینوپاتی، نوروپاتی و آلبومینوری را داشتند. میانگین سنی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی، درموپاتی دیابتی، تینه‌آپدیس، پارونیشیای کاندیدیایی، درماتوفیت ناخن، اینترتریگوی کاندیدیایی و خارش به طور معنی‌داری بالاتر بود (به ترتیب ۹±۵۸،۱۰±۵۷،۱۰±۵۹،۹±۵۷،۹±۵۹و۱۰±۵۷ سال در مقابل ۱۱±۵۴، ۱۱±۵۳، ۱۱±۵۳، ۲±۵۲، ۳±۵۱، ۱۱±۵۳ و ۱۱±۵۴ سال) و در بیماران مبتلا به گرانولوم آنولر پایین‌تر است (۱۴±۴۸ سال در مقابل ۱۱±۵۴). میزان HbA_1c در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی و اینترتریگوی کاندیدیایی بالاتر بود (به ترتیب ۱/۴±۹/۳، ۱/۴±۸/۵ درصد در مقابل ۱/۶±۷/۷ و ۱/۶±۷/۷ درصد).

جدول ۳- بررسی تاثیر میانگین سنی، مدت زمان ابتلا و نوروپاتی بر ایجاد ضایعات پوستی مرتبط با دیابت*

ضایعه پوستی مرتبط با دیابت	نسبت شانس (حدود اطمینان ۹۵٪)
سن (سال)	۱/۰۱(۱/۰۰۱-۱/۰۳)
مدت زمان ابتلا (سال)	۱/۰۴(۱/۰۱-۱/۰۶)
نوروپاتی (وجود یا عدم وجود)	۱/۹(۱/۵-۲/۵)

* جنسیت، HbA_1c، BMI، مدت زمان ابتلا، نوع درمان، رتینوپاتی و آلبومینوری از مدل خارج شدند.

درصد زنان مبتلا به گرانولوم آنولر، آکانتوزیس نیگریکانس و اینترتریگوی کاندیدیایی به طور معنی‌داری نسبت به مردان مبتلا بالاتر بود و تمام بیماران مبتلا به نکروبیوزیس لیپوئیدیکا زن بودند و درصد مردان مبتلا به درموپاتی دیابتی، اریتراسما، تینه‌آپدیس و درماتوفیت ناخن نسبت به زنان مبتلا بالاتر بود. نمایه توده بدنی در بیماران مبتلا به آکانتوزیس نیگریکانس به طور معنی‌داری بالاتر بود و در مبتلایان به خارش پایین‌تر بود.

جهت بررسی تاثیر میانگین سنی، HbA_1c، مدت زمان ابتلا، جنسیت، نمایه توده بدنی، نوع درمان، نوروپاتی، رتینوپاتی و آلبومینوری بر ایجاد ضایعات پوستی مرتبط با دیابت از مدل لجستیک رگرسیون استفاده شد که تنها سن، مدت زمان ابتلا و نوروپاتی وارد مدل شدند. نوروپاتی ایجاد ضایعات پوستی مرتبط با دیابت را با احتمال ۹۵ درصد ۲/۵-۱/۵ برابر می‌کند و سن و مدت زمان ابتلا به دیابت هم بر ایجاد ضایعات پوستی تأثیر ضعیفی دارند (جدول ۳).

بحث

این مطالعه نشان داد که دو سوم بیماران دیابتی نوع ۲ مبتلا به عوارض پوستی دیابت هستند. میانگین سنی، مدت زمان ابتلا، رتینوپاتی و نوروپاتی در بیمارانی که ضایعه پوستی داشتند، نسبت به بیمارانی که ضایعه پوستی نداشتند و درصد مردان مبتلا به ضایعات پوستی نسبت به زنان مبتلا به ضایعات پوستی به میزان معنی‌داری بالاتر است.

شیوع تظاهرات پوستی در بیماران دیابتی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده، که با مطالعه کنونی مطابقت دارد (۱۰-۸). علت درصد بالاتر ابتلای مردان به ضایعات پوستی می‌تواند به این دلیل باشد که مردان بدلیل شغلشان تماس بیشتری با آلودگی‌های محیطی داشته و همچنین درصد صدمات وارده به آنها نیز بیشتر از زنان است. در مطالعه Sesmaz، درصد زنان مبتلا به نسبت مردان مبتلا بالاتر بود که در مورد علت این تفاوت نیز علتی بیان نشده است (۵).

تنها ۸٪ ضایعات پوستی در فاصله زمانی کمتر از یک‌سال از زمان تشخیص دیابت ظاهر شدند که می‌تواند تاییدی بر نقش نوروپاتی در ایجاد ضایعات پوستی باشد که با افزایش مدت زمان ابتلا به دیات افزایش می‌یابد. در مطالعات قبلی در این زمینه مطلبی ذکر نشده است.

شایعترین تظاهر پوستی منفرد با شیوع ۳۲/۳٪ درموپاتی دیابتی است که با تعدادی از مطالعات قبلی مطابقت دارد (۱۲،۱۱) ولی نسبت به مطالعه انجام شده توسط Roman که شیوع ۱۲/۵٪ و Foss که شیوع ۱/۲٪ را گزارش کرده‌اند بیشتر است (۱۴،۴). هر دو مطالعه مذکور شیوع تظاهرات پوستی را هم در بیماران نوع یک و هم نوع دو سنجیده‌اند، در حالیکه در مطالعه کنونی بیماران نوع ۲ بررسی شده‌اند. شیوع درموپاتی دیابتی در مطالعه ما نسبت به مطالعه‌ای که توسط Sesmaz بر روی بیماران نوع دو دیابت انجام شده است و شیوع درموپاتی را ۱۱/۲٪ گزارش کرده بود، بیشتر است (۵). علت تفاوت در میزان شیوع می‌تواند ناشی از تفاوت در نوع ضایعات مورد بررسی قرار گرفته و یا تفاوت در میانگین سنی، طول مدت دیابت و وجود عوارض دیابت باشد که در مطالعه مذکور این متغیرها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. شیوع

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]

تظاهرات پوستی ناشی از عفونتهای باکتریال و قارچی، ۴۱/۵٪ می‌باشدکه در بین این تظاهرات پوستی تینه‌آپدیس، شایعترین تظاهر پوستی بود. شیوع عفونتهای پوستی در مطالعه Romano ۶۱٪ و در مطالعه Talat نیز ۶۲/۲٪ بود و در مطالعه Sesmaz ۳۱٪ گزارش شده است (۴،۱۳،۵). علت تفاوت در شیوع این تظاهرات می‌تواند ناشی از تفاوت در میزان کنترل قند خون، میزان آموزش در زمینه بهداشت پا و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در جامعه مورد بررسی باشد. به عنوان مثال در مطالعه Talat بیش از ۵۰٪ بیماران، کنترل مناسبی از نظر دیابت نداشته و FBS های بالای ۱۸۰mg/dl داشتند.

آکانتوزیس نیگریکانس با ۲۶/۴٪ در مقام سوم شیوع قرار دارد. در سه مطالعه قبلی شیوع ۵/۹، ۱۶/۷ و ۷ درصد مشاهده شده است (۱۶-۱۴)که می‌تواند نمایانگر شیوع بالاتری از مقاومت به انسولین در جمعیت مورد مطالعه ما باشد، چراکه در هر سه مطالعه مذکور بیمارانی با هر دو نوع دیابت تحت بررسی قرار گرفته‌اند که مسلم است مقاومت به انسولین و در نتیجه احتمال وجود آکانتوزیس نیگریکانس در جمعیت مورد مطالعه ما که تنها بیماران نوع دو هستند، بیشتر بوده است.

لیپوهیپرتروفی و لیپوهیپوتروفی به ترتیب در ۰/۳ و ۰/۱ درصد بیماران دیده شد و در هیچ مطالعه‌ای به جز مطالعه Tariq که شیوع ۲/۴٪ را گزارش کرده است، گزارشی از این عوارض نشده است (۶). در مطالعه ما، تمام این ضایعات درکلینیک‌های پوست دیده شدند که این امر می‌تواند به عنوان عاملی در شیوع بالاتر این عوارض در مطالعه ما دخیل باشد. البته با توجه به این که ترومای ناشی از سرما و یا آلودگی به الکل و یا زاویه نامناسب تزریق در ایجاد لیپوهیپوترفی دخیل هستند، بنابراین عدم آموزش مناسب در زمینه نحوه تزریق انسولین هم می‌تواند در این امر دخیل باشد ولی اثر آنابولیک انسولین تنها پاتوژنز احتمالی در ایجاد لیپوهیپرتروفی است و بنابراین توجیهی به جز توجیه فوق در زمینه شیوع بالاتر این تظاهر پوستی در مطالعه ما موجود نیست.

میانگین سنی، درصد HbA_1c، درصد مردان مبتلا، مدت زمان ابتلا، درصد بیماران تزریق‌کننده انسولین، رتینوپاتی، نوروپاتی و آلبومینوری در درموپاتی دیابتی به میزان معنی‌داری نسبت به گروه غیرمبتلا بالاتر است که با مطالعات قبلی همخوانی دارد (۱۷،۱۲) به عنوان مثال Shemer و همکارانش، ۱۷۳ بیمار دیابتی را بررسی کردند و درموپاتی دیابتی در ۶۳، ۶۲ و ۶۳ درصد بیماران با رتینوپاتی، نوروپاتی و نفروپاتی دیده شد

با توجه به مسائل فوق به نظر می‌رسد که بیمارانی با این عارضه باید به طور جدی‌تری از جهت عوارض میکرووواسکولر ارزیابی شده و اقدامات درمانی لازم در اسرع وقت شروع شود.

نوروپاتی در نیمی از تظاهرات ناشی از عفونتها به طور معنی‌داری بالاتر از گروه غیرمبتلا است که می‌تواند به این دلیل باشد که نوروپاتی، خشکی پوست، درصد تروماهای وارده به اندام‌ها، ترک پوست و در نهایت نفوذ عوامل عفونی را افزایش می‌دهد. میانگین سنی در بیش از نیمی از این تظاهرات به میزان معنی‌داری بالاتر از گروه غیرمبتلا است که در تایید این مطلب، Bouguerra ریسک فاکتور عمده برای عفونتهای قارچی را سن بیماران و طول مدت بیماری می‌داند (۱۸). اکثر این ضایعات سیری مزمن داشته و از زمان مطالعه بیش از ۳ ماه فاصله داشتند اما در تعدادی از بیماران مبتلا به اینترتریگوی کاندیدیایی که زمان مذکور کمتر از ۳ ماه بود، HbA_1c سنجیده شده به طور معنی‌داری بالاتر از گروه غیر مبتلا بود. در مطالعه Rayfield هم ذکر شده که عدم کنترل قند خون می‌تواند بیمار را دچار نقص ایمنی و در نتیجه مستعد به عفونتهای خاصی در پوست و نسج نرم کند (۱۹). با توجه به مطالب فوق وجود ضایعات فوق در بیماران دیابتی، توجه خاص را به کنترل قند خون و آموزشهای دقیق‌تر و منسجم‌تری را در زمینه بهداشت پا می‌طلبد چرا که عدم توجه به این امر عواقب ناگواری چون عفونتهای شدید پا، گانگرن و در نهایت قطع عضو را بدنبال خواهد داشت. همچنین با توجه به این که برخی از این ضایعات قبل از تشخیص دیابت، ظاهر می‌شوند لذا بهتر است غربالگری دیابت در این بیماران انجام شود. در بین تظاهرات فوق تینه‌آپدیس شایعترین تظاهر پوستی بوده و رتنیوپاتی، نوروپاتی، آلبومینوری، میانگین سنی، جنسیت مرد و مدت زمان ابتلا به دیابت در این ضایعه پوستی به میزان معنی‌داری بالاتر بود که موید ایجاد این ضایعه در بیمارانی با ابتلا طولانی مدت به دیابت و به تبع آن ایجاد عوارض میکرووواسکولر است. بنابراین این بیماران هم بهتر است مانند بیماران مبتلا به درموپاتی دیابتی به طور جدی‌تری از جهت عواض میکرووواسکولر بررسی شوند. میزان BMI و تعداد افراد مونث درگیر به طور معنی‌داری در بیماران مبتلا به آکانتوزیس نیگریکانس بالاتر است که هر دو نشانگر شیوع بالاتر مقاومت به انسولین در افراد چاق و در نتیجه شیوع بالاتر آکانتوزیس نیگریکانس در این افراد است. سایر متغیرها تفاوت معنی‌داری بین این بیماران و گروه غیرمبتلا نداشت. بنابراین وجود این عارضه، تلاش مبرمی را در زمینه کاهش مقاومت به انسولین

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]

کـه در رأس آن کـاهش وزن اسـت را مـی‌طلبـد. ایـن ضـایعه پوستی هم می‌تواند قبل از تشخیص دیابت ظاهر شود بنابراین غربالگری ایـن بیمـاران هـم از نظـر دیابـت منطقـی بـه نظـر می‌رسد.

میانگین سنی، HbA_{1c}، مدت زمان ابتلا به دیابت، تعداد افـراد تزریق کننده انسولین، رتینوپاتی، نوروپـاتی و آلبومینـوری، در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بـه طـور معنـی‌داری بـالاتر است که با مطالعات قبلی در این زمینه همخوانی دارد. Miller شیوع ترکیب نوروپـاتی و بیمـاری عـــروق محیطـــی را در زخم پای دیابتـــی ۲۰-۱۵٪ گـــزارش کـــرده اسـت (۲۰). بنابراین بیماران مبتلا به زخم پای دیـابتی هـم بایـد از جهـت عوارض میکروواسکولر و کنترل قند خون و آمـوزش‌هـای لازم در زمینـه درمـان و تـسریع در بهبـودی زخـم پـای دیـابتی و پیشگیری از آن مورد توجه خاصی قرار گیرند.

میانگین سنی در بیماران مبتلا به گرانولوم آنولرژنرالیزه به طور معنی‌داری پایین‌تر و افراد مونث درگیر و درصد افـرادی کـه از انسولین استفاده می‌کنند، به طور معنی‌داری بـالاتر اسـت. بـا توجه به این که علی‌رغم سن پایین‌تر و عدم تفاوت معنی‌داری در مـدت زمـان ابـتلا، درصـد مـصرف‌کننـدگان انـسولین در دارندگان این تظاهر پوستی به طور معنی‌داری بالاتر است لـذا شاید بیماران مبتلا به این ضایعه پوستی، بـا سـیری سـریع‌تـر دچار کمبود انسولین مـی‌شـوند و بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن ضایعات قبل از تشخیص دیابـت ظـاهر مـی‌شـوند، غربـالگری دیابت در آنها منطقی به نظر می‌رسد.

تمـام بیمـاران مبـتلا بـه لیپـوهیپرتروفی و لیپوهیپـوتروفی، رتینوپاتی، نوروپـاتی و آلبومینـوری را داشـتند کـه مـی‌توانـد نشانگر مدت طولانی‌تر ابتلا به دیابت در بیمارانی است کـه در نهایت مجبور به تزریق انسولین می‌شـوند کـه در ایـن صـورت شانس ایجاد عوارض میکروواسکولر هم بالاتر خواهد بود.

نوروپاتی و مدت زمان ابتلا در مبتلایـان بـه خـارش، بـه طـور معنی‌داری بالاتر از گروه غیر مبـتلا اسـت کـه نـشانگر ایجـاد خشکی در پوسـت و ثانویـه بـه آن خـارش و احتمـالاً ازمـان بیماری در بیماران مبتلا به خارش است. BMI در این بیماران هم به طور معنی‌داری پائین‌تر از گـروه غیـر مبـتلا اسـت کـه می‌تواند نشانگر آتروفی عضلانی ثانویه بـه نوروپـاتی باشـد. در بین این متغیرها تنها نوروپاتی، احتمال ایجاد ضایعات پوسـتی مرتبط با دیابت را در بیمـاران دیـابتی نـوع دو ۲/۵-۱/۵ برابـر می‌کند که مـی‌توانـد مویـد شـانس ایجـاد تروماهـای متعـدد، خشکی پوست و متعاقب آن خارش و در نهایـت نفـوذ عوامـل میکروبـی در بیمـارانی باشـد کـه نوروپـاتی دارنـد همچنـین نوروپاتی مظهری از میکروآنژیوپاتی است که در پاتوژنز برخـی از ضایعات پوستی دخیل است.

این مطالعه دارای محدودیت‌هایی است. اولاً معاینه پوسـتی در برخی از بیماران در ناحیه کشاله‌ران، زیر بغل و یـا زیـر سـینه امکان پذیر نبود، لذا می‌تواند در تخمین شیوع ضایعات پوستی اختلال ایجاد کند، البته برخی از ضایعات پوستی که بـا شـرح ضایعه توسط بیمار به احتمال قریب به یقـین، تـشخیص آنهـا داده می‌شد، در مطالعه آورده شدند. ثانیاً علل دیگر نوروپـاتی، تنها با شرح حال رد شدند و انجام آزمایشات مربوطه در تمـام بیمـاران امکـان‌پـذیر نبـود. ثالثـاً حـدود ۴۰٪ بیمـاران در کلینیک‌های پوست ویزیت شدند که این امر هم می‌تواننـد در تخمین شیوع ضایعات اختلال ایجاد کند.

در مجموع، حـدود دو سـوم بیمـاران دیـابتی نـوع دو، تظـاهر پوستی را نشان مـی‌دهنـد و بـا توجـه بـه ایـن کـه برخـی از تظاهرات پوستی از جمله آکانتوزیس نیگریکانس، عفونت‌هـای باکتریال و قـارچی، نکروبیـوزیس لیپوئیـدیکا و گرانولـوم‌آنـولر ژنرالیزه قبل از تشخیص دیابت ظاهر مـی‌شـوند، لـذا منطقـی است که این بیماران از جهت دیابت غربالگری شوند. بـا توجـه به این که عفونتهای پوستی باکتریال و قارچی و تـاول دیـابتی می‌توانند منفذی جهت ورود میکروبهای تهاجمی‌تر باشند و در حضور عوارض میکروواسکولر عواقب ناگواری چـون عفونتهـای شدید، گانگرن و قطع عضو را بدنبال داشته باشند لذا توجـه و آموزش بیـشتر در ایـن زمینـه بـه بیمـاران و آشـنایی بیـشتر متخصصین مربوطه را می‌طلبد.

برخی از ضایعات پوستی که بـرای بیمـار مـشکلاتی را از نظـر روانی ایجاد می‌کنند (قرمزی صورت و گزانتوم) با کنترل بهتـر قند خون قابل برگشت هستند. بنابراین اهمیت کنتـرل دقیـق قند خون هرچه بیشتر نمایان می‌گردد.

در کل ضایعات پوستی در یک بیمار ممکن است نـشانگر نیـاز به بررسی دقیق‌تر از جهت عوارض دیابت و یا کنترل دقیـق‌تـر قند خون باشد و برخی از ضـایعات پوسـتی هـم نـشانگر نیـاز جهت غربالگری دیابت هستند. بنابر این تمام پزشکان عمـومی و متخصصین مربوطه بایـد بتواننـد ایـن ضـایعات را تـشخیص دهند و یا در صورت نیاز به متخصصین پوست ارجاع دهند تـا اقدامات پیشگیرانه و یا درمانی مناسب انجام شود.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از آقای دکتر رجب و سایر اعـضای انجمـن دیابـت ایران برای فراهم نمودن امکانات لازم جهت ویزیت بیماران در

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]

مرکز انجمن دیابت ایـران، پرسـنل آزمایـشگاه رفـرانس بـرای همکاری لازم با بیماران جهت انجام آزمایشات آنهـا، همکـاران مرکز تحقیقات غدد به ویـژه واحـد تایـپ و آمـار، بـرای ارائـه خدمات مربوطه سپاسگزاری می‌نمایند.

REFERENCES

1. American Diabetes Association. Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S11-4.
2. Gupta AK, Konnikov N, MacDonald P, Rich P, Rodger NW, Edmonds MW, et al. Prevalence and epidemiology of toenail onychomycosis in diabetic subjects: a multicentre survey. Br J Dermatol 1998;139(4):665-71.
3. Perez MI, Kohn SR. Cutaneous manifestations of diabetes mellitus. J Am Acad Dermatol 1994;30:519-31.
4. Romano G, Moretti G, Di Benedetto A, Giofre C, Di Cesare E, Russo G, et al. Skin lesions in diabetes mellitus: prevalence and clinical correlations. Diabetes Res Clin Pract 1998;39(2):101-6.
5. Sasmaz S, Buy Ukbese MA, Cetin Kaya A. The prevalence of skin disorders in type -2 diabetic patients. Int J Dermatol 2005;3:3-8.
6. Tariq M, Arfan B, Humayun A. Cutaneous manifestations of diabetes mellitus. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2005;15:227-32.
7. Mogtaderi A, Bakhshipour A, Rashidi H. Validation of Michigan neuropathy screening instrument for diabetic peripheral neuropathy. Clin Neurol Neurosurg 2006;108:477-81.
8. Halprin KM, Ohkawara A. Glucose entry into the human epidermis,: the concentration of glucose in the human epidermis. J Invest Dermatol 1967;559–60.
9. Chiheb S, Khadir K, Jarmouni R. Cuteneous manifestations of diabetes mellitus. Nouvelles Dermatologiques 2002;21(21): 64-7.
10. Boulton AJM, Vileikyte L. The diabetic foot: The scope of the problem. J Fam Pract 2000;49(supp):S3-S8.
11. Borssen B, Bergenheim T, Lithner F. The epidemiology of foot lesions in diabetic patients aged 15-50 years. Diabet Med 1990;7(5):438-44.
12. Shemer A, Bergman R, Linn S, Kantor Y, Friedman-Birnbaum R. Diabetic dermopathy and internal complications in diabetes mellitus. Int J Dermatol 1998;37(2):113-5.
13. Talat N, Nabeel A, Naueen A. skin manifestations among diabetic patients admitted in a general medical ward for various other medical problems. Pakistan Journal of Sciences 2002;18:291-6.
14. Foss NT, Polon DP, Takada MH. Skin lesions in diabetic patients. Rev Saude Publica 2005;39:1-5.
15. Beisswenger PJ, Moore LL, Curphey TJ. Relationship between glycemia control and collagen-linked advanced glycosylation end products in type I diabetes. Diabetes Care 1993;16(5):689-94.
16. Diris N, Colomb M, Legmarie F. Non infections skin conditions associated with diabetes mellitus. Ann Dermatol Venereol 2003;130:1009-14.
17. Danowski TS, Sabeh Co, Sarver ME. Shin spots and diabetes mellitus. Am J Med Sci 1966;251(5):570-5.
18. Bouguerra R, Essais O, Sebai N, Ben Salem L. Prevalence and clinical aspects of superficial mycosis in hospitalized diabetic patients in Tunisia. Med Mal Infect 2004;34:201-5.
19. Rayfield EJ, Ault MJ, Keusch GT. Infection and diabetes: the case for glucose control. Am J Med 1982; 72:439.
20. Miller OF. Ambulatory care of the diabetic wound. Wounds 2000;12 (6 supple B): 90B–94B.

[Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2026-11-15]