

Investigation of the Thickness of the Retinal Nerve Fiber in Multiple Sclerosis Recurring-Recovery: A Longitudinal Study

Omid Mirmosayeb¹, Navid Mmanouchehri², Nafise Toghiani², Alireza Dehghani³, Khodayar Golabchi⁴, Leyla Dehghani⁵, Shervin Badihian², Emad Fayyazi¹, Vahid Shaygannejad^{6*}

1. Medical student, Neuroscience Research Center and Neurology, School of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2. Doctor, Neuroscience Research Center and Neurology Department, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3. Professor, Ophthalmology Research Center, Faculty of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4. Doctor, Ophthalmology Research Center, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5. New School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6. Professor, Neuroscience Research Center and Neurology Department, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

(Received:2017/11/14

Accept: 2018/02/24)

Abstract

Background: The previous studies suggest that Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL) thickness decreases over time in Multiple Sclerosis (MS) and can be a marker of disease activity for patients' follow-up. Here, we aimed to compare RNFL thickness in patients with Relapsing Remitting MS (RRMS) during three years of follow-up.

Methods: In the present prospective study, patients with diagnosis of RRMS and history of optic neuritis were included. Demographic features and disease characteristics were collected and underwent Optical Coherence Tomography (OCT). OCT was repeated after three years and the obtained values were compared.

Results: A total of 12 patients (11 women) with the mean age of 35.6 ± 6.1 years and mean disease duration of 5.3 ± 5.8 were included in the study. RNFL thicknesses were $101.27 \pm 9.15\mu\text{m}$ and $92.00 \pm 7.96\mu\text{m}$ in the left eye at the baseline and after 3 years, respectively ($P\text{-value} < 0.001$). In the right eye, RNFL thicknesses were $99.72 \pm 16.37\mu\text{m}$ and $86.36 \pm 20.35\mu\text{m}$ at the baseline and after 3 years, respectively ($p=0.014$).

Conclusions: We found a significant decrease in RNFL thickness in RRMS patients after 3 years of follow up, in spite of getting immunomodulatory treatment. We recommend OCT as an inexpensive and feasible tool for outcome measurement in RRMS patients.

Keywords: Retinal Nerve Fiber Layer, thickness decreases, Multiple Sclerosis

* Corresponding Author: Vahid Shaygannejad
Email:Shaygannejad@med.mui.ac.ir

بررسی تغییر ضخامت لایه فیبرهای عصبی اطراف عصب بینایی در طی ۳ سال پیگیری: یک مطالعه طولی

امید میرمیتب^۱، نوید منوچهری^۲، نفیسه طغیانی فر^۳، علیرضا دهقانی^۳، خدایار گلابچی^۴، لیلا دهقانی^۵، شروین بدیهیان^۶، عmad فیاضی^۱، وحید شایگان نژاد^{۶*}

- ۱- مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۳- مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشکده پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۴- مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۵- دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۶- مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۵ تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۳

چکیده:

سابقه و هدف: مطالعه های قبلی نشان می دهد که ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه (*RNFL*) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کاهش می یابد و می تواند نشانگر فعالیت بیماری در پیگیری بیماران باشد. در این مطالعه ما با هدف مقایسه ضخامت *RNFL* در بیماران مبتلا به ام اس عود کننده-بهبود یابنده (*RRMS*) طی سه سال پیگیر شدیم.

روشی ها: در این مطالعه طولی، بیماران مبتلا به تشخیص *RRMS* و با سابقه التهاب عصب بینایی وارد شدند. مشخصات دموگرافیک و ویژگی های بیماری جمع آوری شد و تحت تصویربرداری (*OCT*) (*Optical coherence tomography*) قرار گرفتند. *OCT* پس از سه سال تکرار و مقادیر به دست آمده، مقایسه شد.

یافته ها: در مجموع ۱۲ بیمار (۱۱ زن) در سن 41 ± 11 سال و مدت بیماری $5 \pm 8/35$ در مطالعه گنجانده شدند. ضخامت *RNFL* برابر با $15/9 \pm 10/1$ میکرومتر و $96/7 \pm 92/100$ در چشم چپ به ترتیب در ابتدا و پس از سه سال ($P-value < 0.001$) بود. در سمت راست، ضخامت *RNFL* به ترتیب در ابتدا و پس از سه سال، $16/14 \pm 37/22$ میکرومتر و $8/20 \pm 35/36$ میکرومتر بود.

نتیجه گیری: در مقایسه با درمان تنظیم کننده اینمی، میزان قابل توجهی از کاهش ضایعات *RNFL* در بیماران *RRMS* بعد از سه سال پیگیری مشخص شد. ما *OCT* را به عنوان یک ابزار ارزان و قابل قبول برای اندازه گیری نتیجه بیماری در مبتلایان به *RRMS* توصیه می کنیم.

وازگان کلیدی: تغییر ضخامت، لایه فیبرهای عصبی بینایی، مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه:

مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی است^(۱). مولتیپل اسکلروزیس عود کننده-بهبود یابنده Relapsing-remitting multiple sclerosis یا *RRMS* رایج ترین نوع بیماری است که در حدود ۵۰ درصد از بیماران دیده می شود^(۲). برای میزان از دست دادن آکسون در این بیماران در نظر گرفته شده است^(۳). ضخامت *RNFL* در بیماران ام اس کمتر از افراد سالم است^(۴). مطالعه های قلی نشان داده اند که ضخامت *RNFL* در بیماران ام اس حتی در صورت نبود دوره های التهاب عصب بینایی، کاهش می یابد^{(۴)، (۶)}. با توجه به یافته های قبلی، ضخامت *RNFL* با اختلال بینایی، از دست دادن آکسون، آتروفی مغزی، مدت بیماری، زیرگردهای بیماری، اختلال های شناختی و جسمی و ناهنجاری های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) مرتبط است^(۶). کاهش ضخامت

نویسنده مسئول: وحید شایگان نژاد
پست الکترونیک: a_mostaar@yahoo.com

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ انجام شد و مقدار معناداری (p) کمتر از هدرصد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

در مجموع ۱۲ بیمار وارد مطالعه شدند که شامل ۱۱ زن و یک مرد بودند. سن بیماران $۶/۱ \pm ۳/۶$ سال بود. مدت بیماری در ابتدای مطالعه $۵/۸ \pm ۱/۶$ سال بود. یک بیمار با فینگولیمود تحت درمان بود و سایر بیماران ایترفرون بتا دریافت می‌کردند. داده‌های دموگرافیک و ویژگی‌های بیماری در جدول ۱ نشان داده شده است.

پس از سه سال پیگیری، هفت بیمار حداقل یک عود را تجربه کرده بودند، پنج مورد یک عود حرکتی داشتند، چهار بیمار یک حمله التهاب عصب بینایی را در چشم چپ و یک بیمار در چشم راست داشتند. میانگین EDSS بعد از سه سال پیگیری از $۱/۷ \pm ۰/۸$ به $۲/۱ \pm ۰/۸$ تغییر کرده بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود ($p>0/05$). مقادیر ضخامت RNFL در جدول ۲ نشان داده است. بعد از سه سال، ضخامت RNFL از $۹/۱۵ \pm ۱/۲۷$ میکرومتر به $۹/۶ \pm ۷/۹۶$ میکرومتر در چشم چپ ($۰/۵ < p < ۰/۰$) و از $۱۶/۳۷ \pm ۹/۹$ میکرومتر به $۲۰/۳۵ \pm ۸/۴$ میکرومتر در چشم راست ($p<0/05$) کاهش یافت. با توجه به مطالعه‌های پیشین، مقدار نرمال ضخامت RNFL بیش از $۹/۷$ میکرومتر است (۱۲). مقادیر ضخامت RNFL در چهار ربع، پس از سه سال پیگیری، به جز در ربع پایین چشم راست، هیچ تغییر آماری قابل توجهی نشان نداد و هیچ ارتباطی بین ضخامت RNFL و سابقه قبلی التهاب عصب بینایی یا عود حرکتی مشاهده نشد ($p>0/05$).

| معناداری | RNFL | | | لایه | چشم چپ (میکرومتر) |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|------|-------------------|
| | میانگین در بعد از ۳ سال پیگیری | میانگین در ابتدای مطالعه | نیاز | | |
| 001/0> | 92±7/96 | 101/27±9/15 | کل | | |
| 0/548 | 83/91±14/36 | 79/18±18/25 | نازال | | |
| 0/284 | 117/91±86/14 | 124/91±13/16 | تحتانی | | |
| 0/261 | 61/54±14/18 | 83/91±8/90 | تمپورال | | |
| 0/288 | 104/54±16/30 | 118/27±22/42 | فوقانی | | |
| 0/014 | 86/36±20/35 | 99/72±16/37 | کل | | |
| 0/121 | 82/10±28/56 | 87/68±28/85 | نازال | | |
| 0/038 | 96/72±31/16 | 106±27/03 | تحتانی | | |
| 0/054 | 63/63±14/73 | 67/95±16/89 | تمپورال | | |
| 0/080 | 108/70±20/40 | 113/63±22/75 | فوقانی | | |
| RNFL: Retinal Nerve Fiber Layer | | | | | |

جدول ۲: مقایسه ضخامت RNFL در ابتدای مطالعه و ۳ سال بعد از پیگیری بیماران

RNFL حتی در مراحل اولیه اماس دیده شده است (۷). توموگرافی انسجام نوری (OCT) روشی غیر تهاجمی و آسان برای اندازه گیری ضخامت RNFL است (۸). یکی از جنبه‌های مهم مدیریت بیماران اماس، ارزیابی اثربخشی درمان و پیشرفت بیماری است (۹). همچنین مهم است که تغییرهای عالم و نشانه‌های بیماری را در طول زمان تشخیص دهیم (۱۰). در این مطالعه، هدف ما بررسی تغییر ضخامت RNFL در بیماران RRMS طی سه سال پیگیری بود.

روش اجرا:

تحقیق به روش مطالعه طولی (Longitudinal) و طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در درمانگاه اماس بیمارستان کاشانی انجام شده است. بیماران با تشخیص RRMS با سابقه التهاب عصب بینایی در این مطالعه وارد شدند. تشخیص RRMS با توجه به معیار مکدونالد (معیارهای تشخیصی برای مولتیپل اسکلروز در طول زمان تکامل یافته است و در حال حاضر در مجموعه‌ای با عنوان معیارهای مکدونالد ۲۰۱۰ به طور گسترده پذیرفته شده است) (۱۱) انجام شد. بیماران مبتلا به بیماری‌های دیگری که بر عصب بینایی و NFL تاثیر می‌گذارند (شامل دیابت و یوویست) از مطالعه حذف شدند. روش نمونه‌گیری از بیماران تصادفی ساده بود و پیش از شروع مطالعه فرآیند آن برای بیماران توضیح داده شد و رضایت‌نامه‌های کتبی آگاهانه از آن اخذ شد.

در ابتدای مطالعه، مشخصات دموگرافیک، طول مدت بیماری و نمره‌های وضعیت ناتوانی (EDSS) از صفر تا ۱۰ به میزان $۰/۵$ واحد افزایش می‌یابد و سطح ناتوانی را در بیماران مالتیپل اسکلروزیس نشان می‌دهد. نمره‌دهی این مقیاس بر اساس معاینه توسط نورولوژیست است (ثبت شد. در همه بیماران هر دو چشم با استفاده از OCT-3، نرم افزار نسخه ۴ (تولید Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA) توسط تکنسین OCT قرار گرفتند. آموزش دیده با نظارت چشم پزشک در مرکز چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان انجام شد. در صورت باز بودن مردمک‌ها به اندازه کافی (۵ میلی‌متر) اسکن چشم بدون استفاده از قطرهای میدریاتیک انجام شد. در صورت نیاز به کشادی مردمک‌ها، از قطره چشمی تروپیکامید یک درصد استفاده شد.

بیماران پس از سه سال برای پیگیری دعوت شدند. تعداد موارد عود، تعداد حمله‌های التهاب عصب بینایی در هر چشم، EDSS و داروهای جاری در این ویزیت ثبت شدند. همچنین، بیماران تحت OCT از هر دو چشم قرار گرفتند که در همان مرکز با کارکنان مشابه و با همان شرایط انجام شد.

متغیرهای کمی با استفاده از میانگین \pm انحراف معیار (SD) و متغیرهای کیفی با استفاده از فراوانی (درصد) توصیف شدند. برای مقایسه ضخامت RNFL در دو نقطه زمانی، از آزمون Paired t-test استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با جدول ۱: ویژگی‌های دموگرافیک و خصوصیات بیماری در ابتدای مطالعه

| میانگین \pm انحراف معیار فراوانی (درصد) | دسته بندی |
|--|--------------------------------------|
| 35/6±6/1 | سن (سال) |
| 1 (۵/۴) (درصد ۱) | |
| 11 (95/5) (درصد ۱) | جنس |
| 5/3±5/8 | |
| 7/1±1 | طول مدت بیماری (سال) |
| 1 (درصد 25) (درصد ۱) | |
| 2 (16/7) (درصد ۲) | مقایسه ناتوانی |
| 2 (16/7) (درصد ۲) | |
| 5 (41/7) (درصد ۵) | ندارد |
| | سابقه التهاب عصب بینایی (درصد) |

بحث:

محدود نمونه‌ها در مطالعه مال است. همان طور که پیش‌تر گفته شد، ضخامت RNFL با اختلال بینای همراه است (۱۰). آسیب آکسونی، آتروفی مغزی، زیرگروه‌های بیماری، مدت بیماران، اختلال‌های MRI و ناتوانی شناختی و جسمی با ضخامت RNFL مرتبط هستند (۱۵)؛ همچنین، RNFL با تعداد عود بیماری، به ویژه حملات التهاب عصب بینای ارتباط دارد (۱۵). در این مطالعه، هیچ ارتباطی بین عود و ضخامت RNFL مشاهده نشد، هرچند اندازه کوچک حجم نمونه ممکن است دلیل بر اتفاقات مشاهده شده باشد. همچنین، اختلال عملکرد بینایی ارزیابی نشد تا ارتباط آن با ضخامت RNFL مشخص شود.

تکنیک تصویربرداری OCT به عنوان یک ابزار برای اندازه‌گیری پیامد در مطالعه‌ها روی بیماران اماس محسوب می‌شود (۱۰). به ویژه، مطالعه‌هایی که اثر یک عامل محافظت‌کننده نورونی را ارزیابی می‌کنند، زیرا این روش ارزان و کاربردی و قابل استفاده است (۱۴). ما نیز کاربرد OCT را برای ارزیابی پیامد بیماری در مبتلایان به اماس تایید و آن را به عنوان یک ابزار راحت تشخیصی برای بیماران توصیه می‌کنیم. مطالعه ما به دلیل تعداد محدود حجم نمونه، نبود ارزیابی اختلال بینایی، انجام ندادن پیگیری تصویربرداری‌های مغزی و نبود گروه کنترل محدود شده بود. با این وجود ما مدت زمانی نسبت طولانی بیماران را پیگیری کردیم و گروه مطالعه ما فقط شامل بیماران RRMS بود. به عنوان نتیجه‌گیری، با وجود درمان‌های تعدیل‌کننده سیستم ایمنی، کاهش قابل توجهی در ضخامت RNFL در بیماران RRMS پس از سه سال پیگیری مشاهده شد.

تحقیق نشان می‌دهد کاهش ضخامت RNFL در بیماران اماس در طول زمان اتفاق می‌افتد. مطالعه‌های پیشین نشان داده‌اند که ضخامت RNFL در طول زمان در بیماران اماس کاهش و میزان این کاهش به ترتیج افزایش می‌یابد. این پدیده حتی در بیماران بدون سابقه التهاب عصب بینایی و همچنین کسانی که با داروهای سرکوب‌کننده ایمنی تحت درمان قرار دارند، اتفاق می‌افتد (۱۰، ۱۳).

تالمن و همکاران مطالعه‌ای بلندمدت روی ۲۹۹ بیمار در سه مرکز درمانی انجام دادند که میانگین پیگیری بیماران ۱۸ ماه بود. آن‌ها ضخامت RNFL را در ابتدای مطالعه و سپس فواصل شش ماهه اندازه‌گیری و این مقادیر را مقایسه کردند. بر اساس یافته‌های آنان، نازک شدن RNFL در طول زمان در بیماران اماس رخ داد (۱۰). یکی دیگر از مطالعه‌های مشابه توسط هررو و همکارانش روی ۹۴ بیمار اماس و ۵۰ فرد سالم انجام شد. آن‌ها سه سال بیماران را پیگیری و کاهش ضخامت RNFL را قسمت فوقانی، تحتانی، گیج گاهی و میانگین کل گزارش کردند (۱۴). یافته‌های ما در مقیاس کوچکتر روی بیماران مبتلا به RRMS تحت درمان با داروهای تعدیل‌کننده سیستم ایمنی مطابق با یافته‌های حاصل از مطالعه‌های پیشین است. اگرچه در مطالعه حال حاضر تعییر معناداری در ضخامت RNFL در نواحی نازل، قدامی و گیجگاهی مشاهده نشد که بر خلاف یافته‌های پیشین است، ما بر این باوریم که این تنافق به دلیل تعداد

منابع:

- Zandi-Esfahan S, Fazeli M, Shaygannejad V, Hasheminia J, Badihian S, Aghayerashti M, et al. Evaluating the effect of adding Fish oil to Fingolimod on TNF-alpha, IL1beta, IL6, and IFN-gamma in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A double-blind randomized placebo-controlled trial. *Clinical neurology and neurosurgery*. 2017;163:173-8.
- Milo R, Miller A. Revised diagnostic criteria of multiple sclerosis. *Autoimmunity reviews*. 2014;13(4-5):518-24.
- Sepulcre J, Goni J, Masdeu JC, Bejarano B, Velez de Mendizabal N, Toledo JB, et al. Contribution of white matter lesions to gray matter atrophy in multiple sclerosis: evidence from voxel-based analysis of T1 lesions in the visual pathway. *Archives of neurology*. 2009;66(2):173-9.
- Sepulcre J, Murie-Fernandez M, Salinas-Alaman A, Garcia-Layana A, Bejarano B, Villoslada P. Diagnostic accuracy of retinal abnormalities in predicting disease activity in MS. *Neurology*. 2007;68(18):1488-94.
- Abalo-Lojo JM, Limeres CC, Gomez MA, Baleato-Gonzalez S, Cadarso-Suarez C, Capeans-Tome C, et al. Retinal nerve fiber layer thickness, brain atrophy, and disability in multiple sclerosis patients. *Journal of neuro-ophthalmology : the official journal of the North American Neuro-Ophthalmology Society*. 2014;34(1):23-8.
- Fisher JB, Jacobs DA, Markowitz CE, Galetta SL, Volpe NJ, Nano-Schiavi ML, et al. Relation of visual function to retinal nerve fiber layer thickness in multiple sclerosis. *Ophthalmology*. 2006;113(2):324-32.
- Lange AP, Zhu F, Sayao AL, Sadjadi R, Alkabie S, Traboulsi AL, et al. Retinal nerve fiber layer thickness in benign multiple sclerosis. *Multiple sclerosis*. 2013;19(10):1275-81.
- Siger M, Dziegielewski K, Jasek L, Bieniek M, Nicpan A, Nawrocki J, et al. Optical coherence tomography in multiple sclerosis: thickness of the retinal nerve fiber layer as a potential measure of axonal loss and brain atrophy. *Journal of neurology*. 2008;255(10):1555-60.
- Barkhof F, Calabresi PA, Miller DH, Reingold SC. Imaging outcomes for neuroprotection and repair in multiple sclerosis trials. *Nature reviews Neurology*. 2009;5(5):256-66.
- Talman LS, Bisker ER, Sackel DJ, Long DA, Jr., Galetta KM, Ratchford JN, et al. Longitudinal study of vision and retinal nerve fiber layer thickness in multiple sclerosis. *Annals of neurology*. 2010;67(6):749-60.
- Polman CH, Reingold SC, Banwell B, Clanet M, Cohen JA, Filippi M, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria. *Annals of neurology*. 2011;69(2):292-302.
- Khanifar AA, Parlitsis GJ, Ehrlich JR, Aaker GD, D'Amico DJ, Gauthier SA, et al. Retinal nerve fiber layer evaluation in multiple sclerosis with spectral domain optical coherence tomography. *Clinical ophthalmology*. 2010;4:1007-13.
- Henderson AP, Trip SA, Schlottmann PG, Altmann DR, Garway-Heath DF, Plant GT, et al. An investigation of the retinal nerve fibre layer in progressive multiple sclerosis using optical coherence tomography. *Brain : a journal of neurology*. 2008;131(Pt 1):277-87.
- Herrero R, Garcia-Martin E, Almarcegui C, Ara JR, Rodriguez-