

خطر استئوآرتیت زانو پیامد حاملگی‌های قبلی

دکتر بهزاد حیدری* و دکتر کریم الله حاجیان**

* دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه داخلی

** دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه پزشکی اجتماعی

خلاصه

استئوآرتیت زانو شایعترین بیماری مفصلی انسان و یکی از مهمترین علت ناتوانی در سالمندان است. بررسی‌های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که این بیماری در زنان شایع‌تر و شدیدتر است. مطالعه حاضر با توجه به دخالت احتمالی استروژن در اتیوپاتوژن استئوآرتیت به منظور بررسی ارتباط استئوآرتیت زانو با حاملگی‌های قبلی انجام شده است. در این مطالعه مورد-شاهدی ۱۹۴ بیمار مبتلا به استئوآرتیت زانو با ۱۹۴ شاهد پس از جور شدن در فاصله سنی ± 5 سال از نظر نمایه توده بدنی (BMI) و تعداد حاملگی‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین تعداد دفعات بارداری و BMI در دو گروه با آزمون t مقایسه شد و نسبت احتمال تطبیق شده (Adjusted odds ratio) برای استئوآرتیت زانو پس از حذف اثر نمایه توده بدنی با مدل رگرسیونی چند گانه لجستیک برآورد شد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین تعداد حاملگی‌ها در بیماران (7 ± 3) و شاهدان (6 ± 3) وجود دارد ($P = 0.005$). نسبت احتمال تطبیق شده ابتلا به استئوآرتیت زانو برای بیش از شش حاملگی (نسبت به شش حاملگی و کمتر) برابر $1/95$ (حدود اطمینان ۹۵ درصد، $3/16-1/24$ ، $P = 0.003$) است. این مطالعه نشان می‌دهد که استئوآرتیت زانو با حاملگی‌های قبلی ارتباط دارد و در موارد بیش از شش حاملگی خطر استئوآرتیت زانو "قریباً" دو برابر می‌شود.

واژگان کلیدی: استئوآرتیت زانو، حاملگی، اختلالات هورمونی

حامگی، می‌توان تصور کرد که ممکن است بارداری عاملی باشد که شیوع و یا شدت استئوآرتربیت زانو را افزایش دهد. بر اساس این مشاهدات و یافته‌های اپیدمیولوژیک موجود، این مطالعه جهت بررسی ارتباط استئوآرتربیت زانو با حاملگی‌های پیشین انجام شده است.

روش بررسی و گزینش بیماران

این مطالعه به روش مورد-شاهدی (case-control) انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه بیمارانی هستند که از اول آبان ۱۳۷۴ تا پایان سال ۱۳۷۶ به بیمارستان شهید بهشتی بابل مراجعه کرده، با تشخیص استئوآرتربیت زانو تحت درمان قرار گرفتند.

تشخیص استئوآرتربیت زانو با معیارهای بالینی-پرتوشناسی کالج روماتولوژی آمریکا (۲۷) تائید شده است. کلیه بیماران قبل از انتخاب شدن، از نظر وجود آرتربیت‌های التهابی عفونی و غیرعفونی، تروماتیک و متابولیک بررسی شدند. در صورت وجود تجمع مایع در مفصل زانو، مکش (آسپیراسیون) مفصلی انجام شد و مایع مفصلی از نظر سلول و کریستال‌های مونواورات سدیم و پیروفسفات کلسیم و وجود باکتری آزمایش گردید. بیماران مبتلا به آرتربیت‌های عفونی، التهابی غیرعفونی زانو و نیز بیمارانی که در مفاصل دیگر آرتربیت التهابی داشتند، همچنین بیمارانی که سابقه ضربه زانو داشتند و یا در آزمایش مایع مفصلی با میکروسکپ نورپلاریزه کریستال نشان دادند، از مطالعه کنار گذاشته شدند. گروه شاهد از بیماران سرپایی مراجعه کننده به همان بیمارستان بودند که به علت بیماریهای دیگر، غیر از استئوآرتربیت زانو مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. افراد گروه شاهد سابقه درد زانو نداشتن و در معاینه مفصل زانو علائم استئوآرتربیت را نشان ندادند.

براساس معیار فوق ۱۹۴ بیمار مبتلا به استئوآرتربیت زانو و ۱۹۴ شاهد برگزیده شدند و در فاصله سنی +۵

مقدمه

استئوآرتربیت زانو یکی از شایع‌ترین بیماری مفصلی انسان و یک عامل مهم در ناتوانی سالماندان است (۱ و ۳). عوامل متعددی چون افزایش سن، چاقی و آسیب‌دیدگی در بروز آن دخالت دارند (۴ و ۱۶) و ارتباط آن با چاقی خصوصاً در زنان در چندین مطالعه نشان داده شده است (۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۸).

افزایش شیوع استئوآرتربیت در افراد فربه نه تنها در مفاصلی که تحت تأثیر وزن قرار دارند، وجود دارد که مفاصل غیرمتحمل وزن، همانند فقرات گردن و مفاصل کوچک انگشتان دست را نیز شامل می‌شود (۱۹). لذا تصور می‌شود که در افراد چاق علاوه بر اثر مکانیکی وزن، عوامل ناشناخته دیگر، احتمالاً به صورت اختلال متابولیکی در بروز استئوآرتربیت دخالت دارند (۲۰، ۷، ۶ و ۲۴).

بررسی‌های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که استئوآرتربیت زانو در زنان شایع‌تر و شدیدتر است و در زنان میان‌سال، پس از یائسگی استئوآرتربیت تعمیم یافته ندولر شایع است (۱۹). در این بیماران مقدار استروژن و تستوسترون خون زیادتر از افراد کنترل است (۲۵). در افراد فربه، از آنجا که تبدیل آندروستنديون به استرادیول در بافت چربی صورت می‌گیرد افزایش غلظت استروژن وجود دارد (۲۶) و این سازو کار برای تولید استروژن در زنان یائسه عامل مهمی به شمار می‌رود. اختلال هورمونی موجود در زمان یائسگی احتمالاً از اوایل بلوغ شروع می‌شود و گمان می‌رود که با چاقی در ارتباط باشد (۲۴). یافته‌های بالا احتمال دخالت استروژن را در اتیوباتوزنر استئوآرتربیت تقویت می‌کند.

مشاهدات ما نشان می‌دهد که در زنان چندرا شیوع استئوآرتربیت زانو بیش از حد معمول است. با توجه به نقش احتمالی هورمونهای جنسی در بروز استئوآرتربیت و وجود اختلالات هورمونی در دوران

متغیرهای نشانگر، نسبت احتمال (odds ratio) OR هر یک از زیر گروه‌های بارداری، در مقایسه با گروه پایه (۳-۰ حاملگی) محاسبه شد. سپس به منظور افزایش تعداد نمونه‌ها، بیماران و شاهدان از نظر تعداد دفعات حاملگی به دو زیر گروه: بیشتر از شش حاملگی؛ شش حاملگی یا کمتر تقسیم شدند و به روش قبلی OR محاسبه شده؛ پس از حذف اثر BMI با مدل رگرسیون لگاریتمی چندگانه نسبت احتمال تطبیق شده ۹۵ درصد تعیین شد.

نتایج

مشخصات بیماران و شاهدان مورد مطالعه در جدول ۱ و توزیع سنی بیماران در جدول ۲ آمده است. با توجه به اطلاعات موجود در این جدولها دو گروه از نظر سن و توزیع سنی مشابه هستند. تعداد بارداریها در گروه بیماران (7 ± 3) بیشتر از شاهدان (6 ± 3) بوده، اختلاف معنیداری را نشان می‌دهد ($P=0.005$). نمایه توده بدنی در گروه بیماران ($28/2 \pm 5$) کیلوگرم بر متر مربع بیش از گروه شاهدان ($25/4 \pm 5$) است ($P=0.001$).

سال جور (matched) شدند. اطلاعات مربوط به سن، دفعات بارداریهای قبلی، پیشینه آسیب‌دیدگی در مفصل زانو با پرسش از بیمار و وجود بیماری التهابی مفصلی نیز با پرسش از بیمار و معاینه به دست آمد. وزن و قد همه بیماران و شاهدان در مراجعه اول به روش استاندارد اندازه‌گیری شد و نمایه توده بدنی از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم، به مریع قد بر حسب متر محاسبه شد.

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرمافزار SAS انجام شد. میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن، دفعات حاملگی‌های پیشین و نمایه توده بدنی دو گروه بیمار و شاهد با آزمون t مورد مقایسه قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی از جداول توافقی و آزمون مجدول کای استفاده شده است. جهت تعیین رابطه بین تعداد حاملگی‌ها و استئوآرتربیت زانو، ابتدا دو گروه بیمار و شاهد از نظر تعداد حاملگی‌ها به چهار زیر گروه: کمتر از چهار حاملگی؛ ۴-۶ حاملگی؛ ۹-۷ حاملگی و ۱۰ حاملگی یا بیشتر طبقه‌بندی شدند، و با کمک مدل رگرسیون چندگانه لگاریتمی (Multiple logistic regression) با تعریف

جدول ۱) مشخصات بیماران و شاهدان مورد مطالعه*

متغیرها	بیماران	شاهدان	مقدار P
تعداد سن (سال)	۱۹۴	۱۹۴	—
	58 ± 11 (۳۰-۸۰)	58 ± 11 (۲۷-۷۸)	0.47
تعداد حاملگی‌ها	۷ ± ۳ (۰-۱۵)	۶ ± ۳ (۰-۱۸)	0.005
نمایه توده بدنی (Kg/m ²)	$28/2 \pm 5$ (۴۳-۱۶/۵)	$25/4 \pm 5$ (۳۸-۱۶/۵)	0.0001

* ارقام به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده‌اند. ارقام درون پرانتز حدود متغیرها را نشان می‌دهد.

جدول ۲) توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی سن بیماران و شاهدان

گروه سنی (سال)	تعداد بیماران (%)	تعداد شاهدان (%)
< ۴۰	۶ (۳/۱)	۶ (۳/۱)
۴۰-۴۹	۴۲ (۲۱/۶)	۴۵ (۲۳/۲)
۵۰-۵۹	۵۶ (۲۸/۸)	۶۳ (۳۲/۵)
۶۰-۶۹	۵۵ (۲۸/۳)	۵۱ (۲۶/۳)
≥ ۲۰	۳۵ (۱۸/۲)	۲۹ (۱۴/۹)
جمع	۱۹۴ (۱۰۰)	۱۹۴ (۱۰۰)

است و نسبت احتمال برای گروه حاملگی ۹-۷ برابر ۱/۷ (حدود اطمینان ۹۵ درصد، ۴/۸۲-۰/۸۶) افزایش یافته است. اما افزایش نسبت احتمال از نظر آماری معنی دار نمی باشد که این ممکن است به علت تعداد ناکافی نمونه ها در گروههای مورد مقایسه باشد.

در جدول ۳، دو گروه برحسب حاملگی ها طبقه بندی شدند: در سابقه ۵۸ درصد بیماران بیش از شش حاملگی وجود دارد؛ در حالی که، این رقم در گروه شاهد ۴۳ درصد می باشد ($P < 0.01$). با توجه به جدول ۳ هر چه تعداد بارداریها بالاتر می رود نسبت احتمال تطبیق شده (Adjusted OR) نیز افزایش یافته باشد.

جدول ۳) توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تعداد حاملگی ها در بیماران مبتلا به استئوآرتیت زانو و شاهدان و نسبت احتمال^{*} ابتلا به استئوآرتیت زانو به ازاء تعداد بارداریها

تعداد حاملگی ها	تعداد بیماران (%)	تعداد شاهدان (%)	نسبت احتمال	نسبت تطبیق شده **	حدود اطمینان ۹۵ درصد	مقدار P
۳-۰	۲۲ (۱۱/۳)	۲۱ (۱۰/۸)	۱	۱	—	—
۶-۴	۵۹ (۳۰/۴)	۸۹ (۴۵/۹)	۰/۶۳	۰/۷۳	(۱/۴۸-۰/۳۶)	۰/۴
۹-۷	۸۲ (۴۲/۳)	۶۴ (۳۲/۹)	۱/۲۲	۱/۷	(۳/۵-۰/۸۲)	۰/۱۵
≥ ۱۰	۳۱ (۱۵/۹)	۲۰ (۱۰/۳)	۱/۴۷	۲	(۴/۸۲-۰/۸۶)	۰/۱۱

* نسبت احتمال ابتلا به استئوآرتیت زانو در هر گروه از حاملگی ها نسبت به ۳-۰ حاملگی تعیین شده است.

** نسبت احتمال تطبیق شده پس از حذف اثر نمایه توده بدنی به کمک مدل رگرسیون چندگانه لگاریتمی

۹۵ درصد، ۳/۱۶-۱/۲۴) می‌رسد که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P=0.003$). با توجه به یافته‌های یاد شده می‌توان گفت که احتمال ابتلا به استئوآرتربیت زانو در زنانی که بیش از شش حاملگی داشتند- در مقایسه با شش حاملگی یا کمتر - تقریباً "دو برابر می‌شود.

وقتی که دو گروه بیمار و شاهد از نظر تعداد دفعات بیشتر از شش حاملگی و معادل یا کمتر از شش حاملگی مقایسه شوند (جدول ۴) در این حالت OR برای گروه دارای بیش از ۶ حاملگی $1/8$ است که پس از حذف اثر نمایه توده بدنی با مدل رگرسیون چندگانه لگاریتمی Adjusted odd ratio به $1/95$ (حدود اطمینان

جدول ۴) مقایسه بیماران و شاهدان که بیشتر و یا کمتر از شش حاملگی داشتند و نسبت احتمال^{*} ابتلا به استئوآرتربیت زانو

تعداد حاملگی‌ها	تعداد شاهدان (%)	تعداد بیماران (%)	تعداد	نسبت احتمال شاهدان (%)	نسبت احتمال تطبیق شده**	حدود اطمینان	مقدار P
بیش از ۶ حاملگی و کمتر (≤ 6)	۸۱ (۴۲)	۱۱۰ (۵۷)	۱	۱	—	۹۵ درصد	0.003 (۱/۲۴-۳/۱۶)
۶ حاملگی (>6)	۱۱۳ (۵۸)	۸۴ (۴۳)	۱/۸	۱/۸	۱/۹۵	(۱/۲۴-۳/۱۶)	0.003

* نسبت احتمال odds ratio

** نسبت احتمال تطبیق شده پس از حذف اثر نمایه توده بدنی با مدل رگرسیون چندگانه لگاریتمی

باشد، به هنگام بارداری زمینه وقوع هر یک از این تغییرات را فراهم می‌آورد. در دوران حاملگی غلظت استروژن افزایش می‌یابد. نقش احتمالی استروژن در اتیوپاتوژن استئوآرتربیت در چندین مطالعه نشان داده شده است (۳۱، ۳۲ و ۳۳). استروژن باعث افزایش چگالی استخوان زیر غضروفی می‌گردد (۳۳) که در افراد فربه خود یک عامل خطرآفرین برای استئوآرتربیت به شمار می‌رود (۹). استروژن خاصیت مخرب غضروف دارد. در بیماران مبتلا به استئوآرتربیت زانو گیرنده‌های استروژن را در غضروف و بافت‌های

بحث

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یک ارتباط مشخص بین استئوآرتربیت زانو و حاملگی وجود دارد و داشتن بیش از شش بارداری، به صورت یک متغیر مستقل احتمال ابتلا به استئوآرتربیت زانو را زیاد می‌کند. حاملگی باعث تغییرات هورمونی و متابولیسمی می‌شود و می‌تواند زمینه شروع یا تشدید تعدادی از بیماریها را فراهم سازد (۲۸ و ۳۰). با توجه به سازو کارهای مولد استئوآرتربیت، که ممکن است ناشی از تغییر در خواص غضروف مفصلی یا افزایش فشار وارد شده بر مفصل

افزایش وزن در زمان حاملگی و افزایش لوردوز فقرات کمری باعث ازدیاد فشار بر مفاصل لگن و انتقال مرکز ثقل وزن به طرف عقب و افزایش فشار بر اندام تحتانی می‌گردد (۳۵). بنابراین، حاملگی می‌تواند از طریق دخالت در عوامل مکانیکی و نیز از طریق تاثیر بر غضروف مفصلی به سازوکارهای مولود استئوارتیت زانو کمک کند. با توجه به اطلاعات موجود می‌توان گفت که بین استئوارتیت زانو و بارداریهای قبلی ارتباط وجود دارد و حاملگی‌های مکرر به احتمال از طریق اختلالات هورمونی یا مکانیکی در ساختار غضروفی یا نیروهای وارد بر آن تغییراتی به وجود می‌آورند که بروز استئوارتیت را تسهیل می‌سازد. برای تایید این رابطه و نیز نقش دخالت فعالیت جسمانی در زنان پراولاد و اثرات مکانیکی ناشی از آن بر مفاصل زانوها (۱۶ و ۲۲) همچنین احتمال دخالت عوامل مخدوش کننده ناشناخته، مطالعه بیشتری در این زمینه را ضروری می‌نماید.

اطراف مفصل یافته‌اند و سطح استروزن مایع مفصلی زانو در استئوارتیت افزایش دارد (۲۳ و ۳۴). در زمان بارداری، هورمون رشد به طور خفیف افزایش پیدا می‌کند و پس از پایان حاملگی نیز در سطح پایین‌تر - ولی افزایش یافته- باقی می‌ماند (۳۵). این هورمون از طریق مستقیم یا غیرمستقیم با تولید موضعی (IGF-I) Insulin Growth Factor-I باعث افزایش توده استخوانی می‌شود (۳۶) که می‌تواند به عنوان یک عامل خطرساز برای استئوارتیت عمل کند. نشان داده‌اند که در بیماران مبتلا به استئوارتیت شدید دو طرفه زانوها و استئوارتیت بند انتهایی انگشتان دست غلظت IGF-I افزایش می‌یابد و بین این دو متغیر ارتباط وجود دارد (۳۳). هورمون رلاکسین (Relaxin) نیز با غلظت زیاد در زمان حاملگی وجود دارد؛ این هورمون از نظر ساختمانی شبیه IGF-I بوده، مانند آن عمل می‌کند (۳۵).

مراجع

1. Spector TD. How serious is knee osteoarthritis? *Ann Rheum Dis* 1992; 51:1105-6.
2. Rejeski WJ, et al. Knee osteoarthritis and health-related quality of life. *Med Sci Sports Exere* 1994; 26:1441-5.
3. Ettinger Wih, et al. Physical disability from knee osteoarthritis. *Med Sci Sports Sxere* 1994; 26:1432-40.
4. Felson DT. Weight and osteoarthritis. *Am Clin Nutr* 1996; 63(3 Suppl): 430-32S.
5. Spector TD, et al. Risk of osteoarthritis associated with long-term weight-bearing sports. *Arthritis Rheum* 1996; 389:988-95.
6. Hochberg MC, et al. The association of body weight, body fatness and body fat distribution with osteoarthritis of the knee: Data from the Baltimore longitudinal study of aging. *J Rheumatol* 1992; 29:460.
7. Karvanon RL, et al. Factors affecting articular thickness in osteoarthritis and aging. *J Rheumatol* 1994; 21:1310-8.
8. Felson DT, et al. Obesity and symptomatic knee osteoarthritis. *Arthritis Rheum* 1996; 130s.
9. Van Saase, et al. Osteoarthritis and obesity in the general population. A relationship calling for an explanation. *J Rheumatol* 1992; 1152-8.
10. Spector TD, et al. Incidence and progression of osteoarthritis in women with unilateral knee disease in the general population, the effect of obesity. *Ann Rheum Dis* 1994; 53:565-8.
11. Le Thbridge-Cejka M, et al. The relationship of age and gender to prevalence and pattern of participants in the Baltimore longitudinal study of aging. *Aging Milano* 1994; 6:353-7.
12. Felson DT, et al. Risk Factors for incident radiographic knee osteoarthritis in the elderly-The Framingham study. *Arthritis Rheum* 1997; 40:728-33.
13. Mannien P, et al. Overweight, gender and knee osteoarthritis. *Int J Obes Relat Metab Disord* 1996; 20:595-7.
14. Zhang N, et al. An epidemiological study of knee osteoarthritis. *Chung Hua Nep- Ko-Tsa Chih* 1995;34:84-7.
15. Zeng Q, et al. Osteoarthritis: clinical and epidemiological investigation. *Chung-Hua Nei- Ko-Tsa-Chih* 1995;34:85-90.
16. Cooper C. Occupational activity and the risk of osteoarthritis. *J Rheumatol Supp* 1995;43:10-12.
17. Anderson JJ, et al. Factors associated with osteoarthritis of the knee in the first national health and nutrition examination survey (HANES I). *Am J Epidemiol* 1988;198:179-89.
18. Messier SP. Osteoarthritis of the knee and associated factor of age and obesity. *Med Sci Sports Exere* 1994;26:1446-52.
19. Felson DT, et al. Understanding the relationship between body weight and osteoarthritis. *Baillieres Clinic Rheumatol* 1997;11:671-81.
20. Marks R, et al. Quadriceps femoris activation changes in genu varum: a possible biomechanical factors in the pathogenesis of osteoarthritis. *J Theor Biol* 1994; 170:283-9.
21. Digirolamo M. Cellular, metabolic and clinical consequence of adipose mass enlargement in obesity. *Nutrition* 1991; 7:287-9.
22. Martin K, et al. Metabolic correlates of obesity and radiographic features of knee osteoarthritis. Data from Baltimore longitudinal study of aging. *J Rheumatol* 1997;24:702-7.
23. Hart DJ, et al. Association between metabolic factors and knee osteoarthritis in women: the chinford study. *J Rheumatol* 1995;22:1118-23.
24. Tsai CL, et al. Osteoarthritis in women, its

- relationship to estrogen and current trends. life Sci 1992;SO:1737-44.
25. Spector TD, et al. Endogenous sex steroid levels in women with generalized osteoarthritis. Clin Rheum 1991;10:316-19.
26. Rebar R. The ovaries. In: Wyngaarden GB, Smith L, Benett LC (eds) Cecil Textbook of medicine. WB Saunders 1992, pp 1355,131.
27. Altman RD. Classification of diseases: Osteoarthritis.Seminar in arthritis and Rheum 1991; 20:40y.
28. Ness RB, et al. Numbers of pregnancies and the subsequent risk of cardiovascular disease. N Engl J Med 1993; 325:1528-35.
29. Baral V. Long-term effects of child bearing on health.J Epidemiol Community Health 1988;39:343-6.
30. Beard CM, et al. Reproductive history in women with coronary heart disease: a case control study. Am J Epidemiol 1984;120:108-14.
31. Sowers MF, et al. Association of bone mineral density and sex hormone levels with osteoarthritis of the hand and knee in permenopausal women. Am J Epidemiol 1996;143:38-47.
32. Oliveria SA, et al. Estrogen replacement therapy and the development of osteoarthritis. Epidemiol 1996;7:415-19.
33. Lloyd MB, et al. Relation between insulin-like growth factor, and fractures in the general population: the Chin ford study. Annals Rheum Dis 1996;55:870-74.
34. Liu SH, et al. Primary Immunolocalization of estrogen and progesterone target cells in the human anterior cruciate ligament. J Orthop Res 1996;14:526-33.
35. Cunningham FG, McDonald PC, et al. William's obstetrics 1997, Appleton & lang pp 191-227.
36. Bouillon R. Growth hormone and bone. Hormone Research 1991;36 (Suppl 1): 49-55.

Previous pregnancies and the subsequent risk of knee osteoarthritis

Heidari B*, Hajian K*

* Babol University of Medical Sciences

SUMMARY

Background: Osteoarthritis of the knee is a major problem and one of the most causes of disability in the elderly. Women tending to have more frequent and more severe evidence of knee osteoarthritis. Because of the possibility, that hormonal changes may influence the disease, the present study was designed to investigate the association between pregnancies and osteoarthritis of the knee.

Methods: In a case-control study, containing 194 cases and 194 age matched controls, data were collected for body mass index (BMI) and numbers of previous pregnancies. The mean (\pm SD) values of these variables were compared by student-t test in the two groups. The association between pregnancies and osteoarthritis of the knee was estimated by adjusted

odds ratio after adjusting for BMI, using multiple logistic regression models.

Results: Women with osteoarthritis of the knee had more pregnancies (7 ± 3) than control (6 ± 3), $P=0.005$. There was an increased risk of knee osteoarthritis in the group with women who had more than six pregnancies (as compared with women who had six or less pregnancies), adjusted OR = 1/95, (95% confidence interval, 1.24-316, $P=0.003$).

Conclusion: This study indicates that having more than six pregnancies is associated with increased risk of knee osteoarthritis.

Key Words: Knee Osteoarthritis, Pregnancy, Hormonal disorders