

The relationship between varicose veins in sublingual varices (SLVs)

Behrrooz Besharat¹, Arezoo Alae^{2*}, Abolfazl Afsharfard³, Milad Sadeghi⁴

1. Dentist, Dental Material Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2. Assistant Professor in Oral Medicine, Oral Medicine Dept, Member of Dental Material Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3. Department of General Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4. Resident of Oral Medicine, Member of Dental Material Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

(Received: 2020/06/13

Accepted: 2020/06/29)

Abstract

Background: Due to the prevalence of sublingual varices, especially in the elderly, and the importance of etiologic studies and the reported, varicose veins are probably related to sublingual varices. The present study was conducted on elderly patients with sublingual varices and their control group in Kahrizak Alborz in 2018.

Materials and Methods: A case control study was conducted by referring to Sanitorium. First, a list of the elderly over 60 was made. The purpose of the study was explained to those in the list and they were included as the sample of the study following their consent. The experimental group included those with sublingual varices and those without sublingual varices were included in control group. Both groups were homogenized in terms of age, gender, smoking, and high blood pressure. Diagnosis of sublingual varices and varicose veins were done based on clinical examination and standard methods of diagnosis. The sublingual varices of the participants were diagnosed based on interviews and examination in a private room. The roles of varicose veins were evaluated running Chi-square test.

Results: A total of 109 patients with sublingual varices and 109 control participants were studied. The subjects in the two groups were similar or did not have significant differences. Exposure to varicose veins in case group was 67 (61%) and 49 (45%) in the control group ($P < 0.025$).

Conclusion: It seems that patients with sublingual varicose tend to be more exposed to varicose veins.

Keywords: Varicose Veins; Sublingual Varices; Elderly, SLVs

* Corresponding author: Arezoo Alae

Email: Arezoo.alae@yahoo.com

بررسی ارتباط واریس زیرزبانی با واریس پا

بهروز بشارت^۱، آرزو علایی^{۲*}، ابوالفضل افشارفرد^۳، میلادصادقی^۴

- دندانپزشک عضو مرکز تحقیقاتی مواددندانی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران
- استادیار گروه بیماریهای دهان عضو مرکز تحقیقاتی مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران
- استاد گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اسلامی، تهران، ایران
- دستیار تخصصی بیماری های دهان فک و صورت، عضو مرکز تحقیقاتی مواددندانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۹

دریافت: ۱۳۹۹/۳/۲۴

چکیده:

سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن واریس زیرزبانی به ویژه در سالمندان و اهمیت مطالعه‌های اتیولوژیک و این که گزارش شده وجود واریس پا با بروز واریس زیر زبانی نقش دارد؛ بنابراین این تحقیق روی سالمندان مبتلا به واریس زیر زبانی و گروه شاهد آن‌ها درآسایشگاه سالمندان کهریزک البرز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. **مواد و روش ها:** تحقیق به روش مورد_شاهدی انجام شد و با مراجعه به آسایشگاه و ارائه معرفی‌نامه موافقت مسئولان آسایشگاه اخذ شد. فهرست سالمندان بالای ۶۰ سال تهیه و با مراجعه به تک تک سالمندان پس از توجیه طرح و کسب رضایت آگاهانه آن‌ها شدند. گروه مورد افرادی بودند که مبتلا به واریس زیرزبانی بودند و گروه شاهد افرادی بودند که اولاً: واریس زیرزبانی نداشتند و ثانیاً از نظر سن و جنس و مصرف سیگار، فشار خون و پروتز دندانی مشابه نمونه مورد بودند. تشخیص واریس زبانی با بررسی کلینیکی و مطابق روش استاندارد انجام شد. تعیین مواجهه از طریق مصاحبه و معاینه در فضای امن انجام شد. سپس نقش واریس پا با واریس زیرزبانی با آزمون کای دو قضاوت آماری شد. **یافته‌ها:** تحقیق روی تعداد ۱۰۹ نفر مبتلا به واریس زیر زبانی و ۱۰۹ نفر گروه شاهد آن‌ها انجام شد. افراد دو گروه با هم مشابه بودند و یا اختلاف معناداری نداشتند. میزان مواجهه با واریس پا در گروه مورد ۶۷ نفر (۶۱ درصد) و در گروه شاهد ۴۹ نفر (۴۵ درصد) بود. ($P < 0.025$) **نتیجه گیری:** به نظر می‌رسد مبتلایان به واریس زیر زبانی در مواجهه بیشتری از نظر واریس پا باشند.

واژگان کلیدی: واریس پا، واریس زیرزبانی، سالمند

مقدمه

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اتیولوژیک باشد، چرا که این ضایعه‌ها در افراد مسن شایع‌ترند، در نتیجه تکامل این ضایعه‌ها می‌تواند ناشی از دژنراسیون وابسته به سن و تغییرهای بافت همبندی دیواره عروق باشد (۱). از دیگر عوامل اتیولوژیک احتمالی مطرح برای واریس زیر زبانی، بیماری‌های کاردیوواسکولار (همانند فشار خون)، portal hypertension، مصرف سیگار، استفاده از دنچر، زن یا مرد بودن و واریس پا و ژنتیک است (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶). اگر همه این عوامل به درستی شناخته نشوند طبعاً اتیولوژی بیماری نامشخص می‌ماند و نمی‌توان در زمینه پیشگیری از ایجاد و گسترش این ضایعه‌ها گامی برداشت. همینطور با نادیده گرفتن علل احتمالی از جمله فشارخون، از شناسایی زودرس بیماری‌های زمینه‌ای نیز باز خواهیم ماند. در تحقیقات اخیر یکی از عواملی که گفته شده می‌تواند در بروز بیماری نقش داشته باشد یا همراه با واریس زیر زبانی باشد، واریس پا است (۱). وریدهای واریسی وریدهای انبساط یافته‌ای هستند که به طور معمول با نمای پیچ خورده و برجسته سطحی روی اندام‌های تحتانی دیده می‌شوند. به نظر می‌رسد بیماری‌های وریدی که سبب برگشت خون از بالا به پایین از دریچه‌های وریدی نارسا می‌شوند، پاتوفیزیولوژی اصلی ایجاد وریدهای واریسی باشد (۷).

در جوامع عادی بروز واریس در زنان بدون در نظر گرفتن شغل آن‌ها ۳۰-۴۰ درصد گزارش شده است. همچنین در مطالعه‌ای که روی افراد ۱۸-۶۴ سال انجام گرفته است، بیش از ۸۰ درصد مبتلا به تالانژکتازی یا واریس‌های مشبک بوده‌اند. در مطالعه‌های

یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های دندان‌پزشکان در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی وجود واریس‌های زیرزبانی است. واریس یا واریکوزیت وریدهای غیرنرمال پیچ و تاب خورده و گشاد شده هستند. واریس‌های زیرزبانی شایع‌ترین فرم واریس در دهان هستند که به طور کلاسیک به صورت برجستگی‌های برآمده یا پاپولر متعدد به رنگ آبی بنفش در سطح شکمی زبان یا کناره‌های طرفی آن ظاهر می‌شوند که در ۲/۳ درصد افراد بالای ۶۰ سال بروز می‌کند (۱).

در گزارشی در کشور اردن، شیوع واریس زیرزبانی به طور میانگین ۲۲/۵ درصد گزارش شده است (۲). این ضایعه‌ها ظاهر ناخوشایندی دارند و می‌توانند سبب نگرانی و ترس در فردی شوند که برای نخستین بار متوجه حضور آن‌ها در دهان خود شده؛ حتی گاهی فوبیای سرطان در فرد به وجود می‌آید و در موارد نادر اگر تروما به آن‌ها وارد شود همورآژی خفیف ایجاد می‌کنند. در بعضی شرایط نیز به خصوص اگر این ضایعه‌ها حالت مزمن داشته باشد ممکن است به طور ثانویه دچار ترومبوز شوند.

اختلال استتیک نیز از دیگر عوارض آن است. این ضایعه‌ها می‌توانند در تشخیص افتراقی با ضایعه‌های دیگری چون همانژیوم‌ها، لنفانژیوم‌ها، کاپوسی سارکوما نیز مطرح باشند که این عامل اهمیت شناخت و تشخیص آن را دوچندان می‌کند (۳). چند توضیح برای پاتوژنز واریس زیرزبانی تاکنون عنوان شده است. به نظر می‌رسد

نویسنده مسئول: آرزو علایی

پست الکترونیک: Arezoo.alaei@yahoo.com

افرادی که واریس زیر زبانی داشتند ۱/۴ درصد بیشتر از آن‌هایی که واریس زیرزبانی نداشتند در مواجهه با واریس پا بودند. (جدول شماره ۲)

بحث

تحقیق نشان داد افرادی که مبتلا به واریس زیر زبانی بودند، واریس پای بیشتری داشتند و افرادی که واریس زیر زبانی نداشتند ۱/۴ درصد بیشتر از آن‌هایی که واریس زیرزبانی نداشتند در مواجهه با واریس پا بودند ($P < 0.025$). در بررسی پیشینه، تحقیق‌های زیادی که نقش واریس پا با واریس زیرزبانی را گزارش کرده باشد، یافت نمی‌شود تا بحث جامع‌تری انجام شود، اما مطالعه‌هایی که در این حیطه موجود است، ارائه می‌شود:

- در مطالعه دکتر Clark و همکاران در سال ۲۰۱۰ در انگلستان در رابطه با عوامل موثر در ایجاد واریس پا در سالمندان انجام شد، این مطالعه روی ۷۹۲ نفر انجام شد که شیوع واریس در زنان ۶۳ درصد و در مردان ۵۷ درصد با میانگین سنی ۷۱ سال بود (۹). در این تحقیق نیز ارتباط مستقیمی بین سن و جنس و ایجاد واریس پا بود که با یافته مطالعه حاضر مشابهت دارد.

- در مطالعه‌ای که آقای حمید شریفی‌نیا و همکارانش در سال ۱۳۸۹ از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی آمل گزارش کردند، از میان ۲۰۳ نفر از پرستاران ۷۳/۹ درصد از افراد مبتلا درجه‌های مختلف واریس پا بودند که از این تعداد ۱۴۵ نفر زن بودند و آن‌ها گزارش کردند که واریس پا ارتباط معناداری با جنس و سن دارد (۱۰). که این یافته با یافته تحقیق حاضر مشابهت دارد.

- دکتر الشیاب و همکاران در سال ۲۰۱۵ در کشور اردن گزارش کردند که افرادی بالای ۴۰ سال سن داشتند و از دنچر استفاده می‌کردند ($P = 0.044$) بیشتر احتمال ریسک بروز واریس زیرزبانی داشتند (۲) که این یافته با یافته تحقیق حاضر مشابهت داشت. اما جامعه مورد بررسی ایشان در دانشگاه سوردون بوده است، ولی محقق روی سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزک البرز تحقیق کرد که شاید مراجعان به دانشگاه سوردون از وضعیت بهتری از نظر سواد و موقعیت اجتماعی بودند. این مطالعه نقش دنچر را با واریس زیر زبانی بررسی کردند، در حالی که در این تحقیق به بررسی رابطه واریس زیرزبانی با واریس پا پرداخته شد.

- در مطالعه دکتر هدرسون و همکاران در سال ۲۰۱۵ در کشور دانمارک گزارش کردند که واریس زیرزبانی با سن ($P < 0.0001$) فشار خون ($P = 0.002$) و مصرف سیگار ($P = 0.025$) همبستگی دارد (۱۱) که در تحقیق پیش‌روی به این مهم دست یافته شد. جامعه بررسی شده محقق فوق با تحقیق حاضر متفاوت بود.

- خانم دکتر ملکی و همکاران برای مقایسه فراوانی ضایعه‌های بافت نرم دهان در سالمندان مقیم آسایشگاه‌های سالمندان دولتی و خصوصی تحت نظارت بهزیستی تهران نتیجه تحقیق را در سال ۱۳۸۴ گزارش کردند. تحقیق به روش توصیفی تعداد ۳۴۳ سالمند با سن بیشتر از ۶۰ سال بررسی کرد که نصف آن‌ها در آسایشگاه دولتی و نصف دیگر در آسایشگاه‌های خصوصی بودند، وضعیت بیماری سیستمیک، داروهای استفاده شده، بررسی و ثبت شدند. بافت نرم اطراف و زیر پروتز، دنچر از دهان بیمار خارج نشده و معاینه مخاط بافت نرم آن‌ها شامل زبان شیاردار، کاندیدیاژیس، آتروفی زبان، استوماتیت ناشی از دنچر، واریس زبانی، ... بررسی و ثبت شد. تحقیق نشان داد که واریس زبانی در ۱۵/۸ درصد بیماران وجود داشت و در کل ضایعه‌های دهانی در ۷۵/۱ درصد در آسایشگاه‌های دولتی و در ۸۰/۵ درصد در سالمندان آسایشگاه‌های خصوصی وجود داشت. این تحقیق تمامی ضایعه‌های بافت نرم دهان سالمندان به ویژه شیوع واریس زیرزبانی را گزارش کرده است اما برخلاف تحقیق حاضر، نقش عوامل، سن، جنس مصرف سیگار، فشار خون، دنچر، واریس و ... بررسی نشده است (۱۲).

- آقای دکتر منصور قنایی و همکاران مقایسه فراوانی ضایعه‌های بافت نرم دهان در جوانان مقیم در شهر رشت را بررسی کرده و نتیجه تحقیق را در سال ۲۰۱۳ گزارش کردند. تحقیق به روش کراس سکشنال روی تعداد ۱۵۸۱ نفر از جوانان با سن کمتر از ۳۰ سال بررسی شد. برای هر فرد سوال‌های طبقه‌بندی شده بر اساس سازمان جهانی بهداشت (WHO) طراحی شد. شرکت‌کنندگان به دو گروه با یا بدون ضایعه‌های بافت نرم داخل هانی تقسیم شدند، وضعیت

مختلف نقش اجابت مزاج، چاقی، رژیم غذایی، قرص ضد بارداری، سواداجتماعی، هورمون‌های ضدبارداری خوراکی و کم‌تحرکی هنگام کار و دخانیات بررسی شده و مشخص شده که شدت واریس در افراد مبتلا به چاقی بیشتر است و تعداد زایمان‌ها در میزان شدت واریس پا نیز موثر است. سابقه کار زیاد و بی‌تحرکی هنگام کار و سرپا ایستادن نیز با آن مرتبط است، اما ارتباطی با قد افراد در این ضایعه وجود ندارد (۸).

پژوهشگر با بررسی پیشینه در دسترس به این نتیجه رسید که تعداد مقاله‌های در این زمینه محدود است و در جامعه ایرانی این نقش بررسی نشده بود. بنابراین با توجه به خلأ اطلاعاتی و کاستی‌های موجود در این تحقیق، رابطه واریس پا با بروز واریس زیرزبانی در میان سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک البرز در سال ۹۷ بررسی شد.

مواد و روش‌ها

تمامی افراد مبتلا به واریس زیرزبانی و گروه شاهد آن‌ها که از بین سالمندان آسایشگاه کهریزک البرز در سال ۹۷ موافقت کتبی و آگاهانه خود را برای همکاری با پژوهش حاضر اعلام کردند جامعه بررسی شده را تشکیل دادند و تحقیق به روش مورد-شاهدی انجام شد.

پس از توجیه افراد شرکت کننده آسایشگاه کهریزک البرز، رضایت‌نامه‌ای دال بر شرکت آن‌ها دریافت شد، سپس فرم اطلاعاتی مشخصات دموگرافیک تکمیل شد. محقق که پیش از این آموزش لازم تحت نظر و مشاوره متخصص بیماری‌های دهان و متخصص جراحی و عروق را دیده بود، با استفاده از ست معاینه شامل پنس، سوند، آینه و گاز استریل دندان‌پزشکی و نور کافی چراغ قوه، بیماران را در یک اتاق امن معاینه کرد و اطلاعات لازم ثبت شد.

گروه مورد افرادی بودند که مبتلا به واریس زیرزبانی بودند و گروه شاهد افرادی بودند که ۱: واریس زیرزبانی نداشتند ۲: از نظر سن و جنس و مصرف سیگار فشار خون و پروتز دندان‌های مشابه نمونه مورد بودند. سپس هر دو گروه را از نظر وجود واریس پا بررسی شدند. بررسی از طریق مصاحبه و معاینه با نور کافی و در فضای امن انجام شد، سپس بررسی شد که آیا افراد دو گروه مشابه هستند یا خیر و بعد نقش واریس پا با واریس زیرزبانی با آزمون کای دو قضاوت آماری شد، odds ratio محاسبه شد. تشخیص واریس زبانی با بررسی کلینیکی دهان و مطابق روش استاندارد انجام شد (۲).

منظور از واریس زیرزبانی، برجستگی‌های برآمده یا پاپولر متعدد به رنگ آبی بنفش در سطح شکمی زبان یا برده‌های طرفی آن است و در این مطالعه به دو دسته تقسیم شدند:

- Grade ۰: واریس زیرزبانی وجود ندارد یا به میزان کمی قابل رویت است (تصویر ۱)
- Grade ۱: متوسط یا شدید است (۸ و ۹). (تصویر ۲)
- منظور از واریس پا برجستگی‌های برآمده ناحیه پا است که تعیین شدت آن بر اساس فرم بازنگری استاندارد CEAP بررسی شد و با توجه به این فرم، شدت واریس از نظر کلینیکی به سه درجه تقسیم بندی شد:
- بدون واریس = C۰
- عروق رتیکولر یا تالانژکتازی = C۱ (به صورت سیاهرگ‌های تار عنکبوتی و بنفش رنگ دیده می‌شود)
- وریدهای واریسی = C۲ (وریدهای گشاد شده و قابل لمس) (تصویر شماره ۳) (۷)

یافته‌ها

تحقیق روی ۲۱۸ سالمند انجام شد. ۱۰۹ نفر در گروه مورد قرار داشتند و واریس زیرزبانی داشتند و ۱۰۹ نفر در گروه شاهد (که واریس زیر زبانی نداشتند) قرار گرفتند. توزیع افراد و بررسی خصوصیات آن‌ها به تفکیک واریس زیرزبانی در جدول شماره ۱ ارائه شد و نشان می‌دهد افراد در دو گروه علاوه بر هم‌زمانی و هم‌مکانی، به لحاظ جنس، سن، مصرف سیگار، فشار خون و پروتز دندان‌های نیز مشابه بودند و اختلاف آن‌ها به لحاظ آماری معنادار نبود. ($P < 0.08$) درضمن از افراد بررسی شده ۱۱۴ نفر مرد و ۱۰۴ نفر زن بودند. (جدول شماره ۱)

افراد بررسی شده بر حسب واریس زیرزبانی با تفکیک واریس پا در جدول شماره ۲ ارائه شده و نشان می‌دهد سالمندانی که واریس زیر زبانی نداشتند ۴۹ نفر (۴۵ درصد) در مواجهه با واریس پا بودند و افرادی که واریس زیر زبانی داشتند ۶۷ نفر (۶۱ درصد) در مواجهه با واریس پا بودند که از این تعداد ۵۹ نفر دارای واریس پا از نوع C۱ و هشت نفر از نوع C۲ بودند.

آزمون کای دو نشان داد که این مواجهه بیشتر با واریس پا به لحاظ آماری معنادار بوده ($P < 0.025$) و odds ratio واریس پا با واریس زیرزبانی برابر ۱/۴ درصد یعنی

از سویی، یک‌دست بودن افراد ساکن در آسایشگاه از نظر شرایط اقتصادی، محیطی، تغذیه‌ای، مراقبتی و ... و نبود بایاس (سوگیری) در مطالعه به دلیل نبود اسپانسر، حامیان مالی و معاینه تعداد زیادی از نمونه‌ها با محبت مسئولان آسایشگاه از جمله مزایای تحقیق بود. در ضمن دهان تمامی سالمندان با دقت و طبق روش کتب مرجع (۱۶) معاینه شد و تعداد سه نفر مبتلا به کاندیدازیس و استوماتیت دنچر بودند و تحت نظر متخصص بیماری‌های دهان، درمان ضدقارچ موضعی به افراد داده شد.

تشکر و قدردانی:

از جناب آقای دکتر سلحشور و آقای دکتر نیکوکار مسئولان محترم آسایشگاه کهریزک البرز و سرکار خانم آجرلو که بدون لطف و همکاری‌شان انجام این تحقیق میسر نبود و راهنمایی داوران محترم و جناب آقای مهندس ناصر ولایی که در به ثمر رساندن این دستاورد از نویسندگان حمایت کردند، تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع:

- Neville B, Damm D, Allen C, Chi A. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th ed. Saunders; 2015. P:13-14
- Al-Shayyab MH, Baqain ZH. Sublingual varices in relation to smoking, cardiovascular diseases, denture wearing and consuming vitamin rich foods. Saudi Med J 2015; Vol.36(3):310-315
- Lazos JP, Piemonte ED, Panico RL. Oral Varix: a review. British society of Gerodontol 2015; 32:82-89
- Ettinger RL, Manderson RD. A clinical study of sublingual varices. Oral Surg Oral Med Oral Patbol 1974; 38:540-5
- Jasser P, Jaramillo M, Nunez DA. Base of tongue varices associated with portal hypertension. Postgrad Med J 2000; 76:576-577
- Wong M, Karuman P. Vallicular varix causing diagnostic confusion in hematemesis. Head Neck. 2008 Dec; 30(12):1643-5.
- Brunnicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter G, Matthews J, et al. Principles of Surgery. 9th ed. New York: McGraw-Hill; c2010. p:450-6
- Nasiri- Foourg A, Kazemi T, Nakhai N, Kazemi N. Lower limb varicose veins and their relationship with risk factors in nurses of the Birjand University of Medical Sciences Hospital's . 2007; 12, No1, 2:60-66
- Clark A, I Harvey, Fowkes FGR. Epidemiology and risk factors for Varicose Vain among older people, cross-sectional study in UKY 2010 Oct; 25(5):236-40
- Sharif nia H, Ghorbani M, Beheshti Z, Taybi S, Mahbobi M, Mirzajani F. Prevalence of Varicose Veins in Nurses and associated risk factors, nurses research, 2010, No.17; 5
- Hedstrom L, Albertsson M, Bergh H. Is there a connection between sublingual varices and hypertension. BMC Oral Health . 2015; 15:78-6
- Maleki Z, Ghaem Maghami A, Lesan S. Determine The Prevalence of Oral Mucosal Lesion In Tehran Sanatoriums, Shahid Beheshti University of Medical sciences dental magazine, 2005, 32; 8:3, 663-7
- Ghanea F, Joukar F, Rabiei M, Dadashzadeh A, Valeshabad A. Prevalence of Oral Mucosal Lesion in an Adult Iranian Population, Iranian Red Crescent Medical jourm. 2013 July; 15:600-4
- Fukaya E, Flores AM, Lindholm D, Gustafsson S, Zanetti D, Ingelsson E, et al. Clinical and Genetic Determinants of Varicose Veins: A Prospective, Community-Based Study of ~500,000 Individuals, 2018 Dec 18; 138(25): 2869-88
- Young-Mo Kim, Ji Won Kim, In Suh Park, Jeong-Seok Cho. Tongue Base Varix as a Source of Oral Bleeding: A Case Report, Medicine (Baltimore), 2019 Oct; 98(42), 1-3
- John S, Turner JR. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3th ed. Boston: Butterworths 1990, chp19 589-593

مشخصات ظاهری و اطلاعات کلینیکی شامل سن، جنس، استعمال دخانیات، بیماری‌های سیستمیک و بهداشت دهان و دندان در این دو گروه جمع‌آوری و بررسی شد. تحقیق نشان داد که فراوانی ضایعه‌های بافت نرم در ۱۹/۴ درصد افراد وجود داشت که این فراوانی در مردها و جوانان بیشتر بود. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، فراوان‌ترین ضایعه موجود در بین افراد زبان شیاردار ۴ درصد بود و واریس زیرزبانی در ۱/۵ درصد بیماران وجود داشت. این تحقیق تمامی ضایعه‌های بافت نرم دهان جوانان به ویژه شیوع واریس زیرزبانی را گزارش کرده است، اما برخلاف تحقیق حاضر نقش عوامل سن، جنس، مصرف سیگار، فشار خون، دنچر، واریس پا و ... بررسی نشده است (۱۳).

محققان معتقد هستند افرادی که با شکایت از خونریزی‌های داخل دهانی ناحیه خلفی و بیس زبان مراجعه می‌کنند، گرفتن تاریخچه دقیق خونریزی و معاینه دقیق داخل دهانی لازم است. همچنین این موضوع ممکن است با آزمایش‌های پاراکلینیکی دقیق مانند سی‌تی‌اسکن، لارنگوسکپی و آندوسکپی و درموارد شدید با آنژیوگرافی ادامه یابد (۱۴). البته واریس به ندرت ممکن است در قاعده زبان کشف شود، اما بسیار نادر هستند و نخستین بار توسط وتریل و همکاران در سال ۱۹۶۷ گزارش شده‌اند. پس از آن بوتون در سال ۲۰۰۲ روی آن‌ها تحقیق کرده است (۱۵). بنابراین در تشخیص‌های کلینیکی خونریزی‌های دهانی و یا آب دهان خون‌آلود باید به واریس‌های خلف دهان نیز توجه کرد.

تحقیق‌های ژنتیک اخیر بروز وریدهای واریسی را در برخی سندروم‌ها مانند Klippel-Trenaunay دخیل دانسته است و موتاسیون ژن FOXC2، فرومومادولین و دسمولین را در این پدیده با تاثیر بر ساختار وریدها موثر دانسته است (۱۴).

از جمله تبعات واریس زیرزبانی به خصوص هنگام پاره شدن، می‌توان به خونریزی، ایجاد درد و سوزش، مشکل در تکلم و خوردن غذا و همچنین امکان نفوذ آلودگی‌های دهان به بدن در سالمندان به خصوص آن‌هایی که سیستم ایمنی پایین دارند، اشاره کرد. از آنجا که امکان رابطه بین واریس پا و واریس زیر زبانی وجود دارد، بنابراین با پیشگیری‌های لازم در رابطه با واریس پا مانند کاهش وزن، استفاده از فیبر در رژیم غذایی، عدم سرپا ایستادن زیاد و استفاده از جوراب واریس اشاره کرد که ممکن است از ایجاد واریس زیرزبانی نیز جلوگیری شود. واریس‌های وریدی پا ممکن است در ۲۰ درصد موارد سبب ایجاد زخم‌های خطرناکی شوند. مطالعه‌های اخیر نشان داده است که افراد درگیر پنج برابر بیشتر در معرض خطر ترومبوزهای اندام‌های تحتانی هستند (۱۴). و اکنون بیش از ۲۲ درصد بودجه مراقبت بهداشتی در انگلستان به کنترل و درمان این بیماری‌ها اختصاص یافته است (۸).

اما سؤال این است که چرا واریس پا ممکن است سبب بروز واریس زیرزبانی شود. با چه فیزیولوژی و با چه آناتومی و با چه مکانیزمی بین این دو ارتباط برقرار است؟ به نظر می‌رسد از نظر آسیب شناسی با مولد بیماری‌های وریدی مشترک است که شاید زمینه‌ساز مشترک ایجاد واریس در پا و زبان است. پیشنهاد می‌شود برای پاسخ به این سوال تحقیق‌های دیگری در آینده ترسیم شود.

با توجه به افزایش طول عمر در جامعه در سال‌های آینده، با افزایش آمار سالمندان مواجه خواهیم بود که این امر سبب افزایش مراجعه افراد مسن به مطب‌های دندان‌پزشکی خواهد شد. از این رو آشنایی با ضایعه‌های دهانی این افراد می‌تواند برای کلینیسین‌ها بسیار کارساز باشد و بیماران را از انجام درمان‌های پیچیده و مشکل‌ساز همانند جراحی‌های بی‌مورد رهایی بخشد.

نتیجه گیری:

به نظر می‌رسد واریس پا با بروز واریس زیرزبانی رابطه دارد.

محدودیت:

یکی از محدودیت‌های تحقیق، بررسی افراد ویژه و ساکن در آسایشگاه بود و البته این افراد نماینده کل جامعه نخواهند بود. دیگر آنکه به دلیل شرایط خاص برخی افراد مانند: دانس، بستری بودن مطلق در رختخواب و ... اجازه معاینه صحیح و دقیق ایشان به ما داده نشد و تعداد نمونه‌های بررسی شده کمتر از انتظار محقق شد. همچنین ضعف ایمنی افراد مسن به دلیل تغذیه، پرستاری و ... ممکن است فاکتور تعیین‌کننده‌ای در ایجاد واریس زیر زبانی باشد که در تحقیق و نتیجه آن موثر است.