

بررسی اثر مهاری عصاره هیدرولکلی گیاه تشنه داری (*Scrophularia striata*) بر روی کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی

محمد رضا هواسیان¹، جعفر پناهی¹، ایرج پاکزاد^{2*}، عبدالله داودیان³، آناهیتا جلیلیان⁴، مونا زمانیان⁵

¹ کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

² مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

³ گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

⁴ گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

⁵ مرکز تحقیقات پرتوئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: کاندیدیازیس مهم ترین بیماری قارچی در زنان واژنیت کاندیدایی میباشد. از زمان های گذشته تاکنون بطور سنتی از گیاه تشنه داری بصورت وسیع در مناطقی از استان ایلام برای درمان انواع مختلف عفونت ها استفاده شده است، هدف از این مطالعه تعیین اثر مهاری عصاره الکلی و آبی گیاه تشنه داری بر روی کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی میباشد.

روش بررسی: تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. گیاه تشنه داری را پس از جمع آوری در محیطی گرم، خشک و کم رطوبت به دور از نور مستقیم و درساخه خشک شد. تهیه عصاره هیدرولکلی با استفاده از دستگاه عصاره گیری انجام گرفت، تاثیر عصاره به روش دیسک دیفیوژن و انتشار در آگار با تعبیه چاهک غلظتهاي 10، 20، 40، 80 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره های هیدرولکلی به مقدار 20μl بر روی هر دیسک استاندارد BLANK DISC و روش انتشار در آگار (تعبیه چاهک) در غلظتهاي 10، 20، 40 و 80 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره هیدرولکلی به مقدار 1ml 3در هر چاهک 3 بار مورد آزمایش قرار گرفت.

یافته ها: نتایج قرائت شده در زمان های 24 و 48 ساعت پس از کشت در دمای 37 درجه سانتی گراد حاکی از بی اثر بودن عصاره الکلی و اثر ضعیف عصاره آبی بر روی کاندیدا بود.

نتیجه گیری: با مشاهده بی تاثیری عصاره الکلی این گیاه میتوان گفت که عصاره الکلی حاوی ترکیبات ضد قارچی نمی باشد. اما عصاره آبی این گیاه در بالاترین غلظت دارای اثر مهاری ضعیفی بوده که ناشی از وجود ترکیبات موثر در گیاه می باشد. پیشنهاد می شود از عصاره فنولی این گیاه در مطالعات دیگر استفاده شود.

واژگان کلیدی: عصاره هیدرولکلی، تشنه داری (*Scrophularia striata*)، کاندیدا آلبیکنس.

آن از طرفی دیگر موجب اهمیت در زمینه بررسی آثار ضد قارچی گیاهان شده است (1). درمان های سنتی ارزانتر و مؤثرتر از درمان های مدرن می باشند و در واقع در جوامعی که از گیاهان داروئی استفاده می کنند خطر کسب عفونت های با عوامل پاتوزن مقاوم کمتر است. از دیرباز در مناطق غربی ایران

مقدمه

گستردگی بیماری های قارچی فرصت طلب در افراد مستعد از یک سو و افزایش روز افزون مقاومت های دارویی و اثرات سوء

آدرس نویسنده مسئول: ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دکتر ایرج پاکزاد (e-mail: pakzad_i@yahoo.com)

محیط کشت سابورو دکستروز آگار (SDA) و سابورو دکستروز براث (SDB) با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده آماده شده بود کشت داده شدند. پس از رشد، از هر نمونه لام تهییه و نمونه های کاندیدایی طبق جداول استاندارد شناسایی و دوباره کشت داده شدند نمونه ها در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند (9).

عصاره آبی: تشنه داری را پس از جمع آوری در محیطی گرم، خشک و کم رطوبت به دور از نور مستقیم و درسایه خشک شد 30 میلی لیتر آب مقطر به 3 گرم پودر گیاه اضافه گردید و به مدت 24 ساعت بر روی شیکر قرار گرفت. محلول مورد نظر جهت حذف ذرات بزرگتر دکانته و ذرات کوچکتر با عبور از صافی غشائی 45 pm_{0/45} حذف گردید (روش نفوذی اصلاح شده). عصاره حاصل در مجاورت هوا به سرعت خشک شد و پودر خشک حاصل پس از وزن کردن در آب مقطر حل گردیده و به عنوان عصاره آبی مورد استفاده قرار گرفت.

عصاره الکلی: برای تهییه عصاره الکلی گیاه از روش خیساندن استفاده شد. در این روش 4 گرم پودر گیاه داخل ظرف شیشه ای تیره ریخته و به آن 500 میلی لیتر اتانول 80 درجه افزوده شد. بعد از 24 ساعت محتويات ظرف سانتریفیوز و رسوبات جدا گردید. با کمک دستگاه حذف حلال در خلاء در دمای 50 درجه سانتی گراد اتانول حذف شد و عصاره تغليظ شده برای خشک شدن به مدت 24 ساعت در دمای 50 درجه سانتی گراد قرار گرفت و پس از خشک شدن کامل در فریزر 20- درجه سانتی گراد تا زمان استفاده نگهداری شد.

روش دیسک دیفیوژن: در این روش از دیسک های بلانک استفاده شد بدین صورت که طبق استاندارد مربوطه پس از شمارش دقیق قارچ ها و تهییه سوسپانسیون استاندارد با مقدار معین قارچ (cfu/ml 2000) آن را بر روی محیط منتقل و با استفاده از سوآپ استریل بر روی سابلور دکستروز آگار کشت داده، و بر روی آن دیسک های بلانک قرار داده و مقدار 20 میکرو لیتر بر دیسک از غلظت های مختلف عصاره را بر روی آن ریخته و دیسک فلوکنزاول را نیز همراه آن قرار داده شد. در این مطالعه از غلظت های 10- 20- 40- 80- 100 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره الکلی و آبی استفاده شد.

روش انتشار در آگار: در این روش نیز از سوسپانسیون تهییه شده (cfu/ml 2000) بر روی محیط کشت سابلور بوسیله سوآپ کشت داده شد و پس از تعییه چاهک هایی به قطر 5 میلی متر ته چاهک ها بوسیله محیط کشت در شرایط استریل

برای درمان عفونت واژنیال از عصاره گیاهی مختلفی استفاده می کردند، در این بین از گیاه تشنه داری هم استفاده شده است. گیاه تشنه داری با نام علمی (*Scrophularia striata*) از تیره گل میمون که در مناطق غربی ایران رشد میکند، در این مطالعه از تمامی قسمت های گیاه از جمله ساقه و ریشه استفاده شده است. مخمر کاندیدا آلبیکنس *Candida albicans*، فلور طبیعی بدن است که در افراد سالم به ندرت باعث بیماری میشود اما به عنوان یک مخمر فرصت طلب در افراد مستعد از قبیل مبتلايان به ایدز و مصرف کنندگان آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و همچنین افرادی که پیوند عضو شده اند ایجاد عفونت می کند. اهمیت بیماری های ناشی از این مخمر ، علاوه بر ایجاد عفونت در افراد مستعد، به بیماران ایدزی مربوط می شود که شاخص اصل ایدز در آنها، کاندیدیازیس (*Candidiasis*) می باشد (2). علاوه بر این گونه های کاندیدا به عنوان چهارمین عامل عفونت های خونی بیماران بستری شده در بیمارستان ها مطرح شده و موجب مرگ و میر 40 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های امریکا شده است (3). کاندیدا آلبیکنس جزئی از فلور طبیعی سطوح مخاطی حفره دهانی، دستگاه گوارش و واژن است. این قارچ در سطوح مخاطی کلونیزه می شود و بنابراین بیشتر عفونت های درون زاد این ناحیه ایجاد می شود (5,4). مقاومت های دارویی روزافون این قارچ و افزایش دوز مصرفی داروهای متداول و به دنبال آن افزایش عوارض جانبی اثر داروها، موجب شده است تا امروزه بیشترین توجه به عواملی با پایه طبیعی مانند گیاهان دارویی با عوارض جانبی خفیف معطوف شود (6-8). هدف از این مطالعه ، تعیین اثر مهارکنندگی عصاره هیدرولالکلی گیاه تشنه داری بر روی کاندیدا آلبیکنس ایزوله شده از نمونه های بالینی جدا شده از واژنیت های قارچی در شرایط آزمایشگاهی بر مبنای یافتن میزان کمترین غلظت مهارکنندگی از 90 درصد رشد قارچ (*Minimum Inhibitory Concentration :MIC90*) و کمترین غلظت کشنده ضد قارچی (*Minimum Fungicidal concentration :MFC*) است.

مواد و روشها

تحقیق به روش تجربی انجام گرفت.
ایزوله های کاندیدا آلبیکنس: پس از نمونه گیری از واژن بوسیله سوآپ استریل و لوله فالکون توسط متخصصین زنان و زایمان، تعداد 30 نمونه جدا شده به آزمایشگاه منتقل و بر روی

جدول 1- اثر مهاری عصاره آبی گیاه تشنه داری بر کاندیدا آلبیکنس

30 µl of Concentration mg/ml	Inhibition zone (10mm hole size)	Filter disk impregnated (20 µl of Concentration mg/ml)	
10 mg/ml	0 mm	200 µg/disk	0 mm
20 mg/ml	0 mm	400 µg/disk	0 mm
40 mg/ml	0 mm	800 µg/disk	0 mm
80 mg/ml	0 mm	1600 µg/disk	0 mm
100 mg/ml	9 mm	2000 µg/disk	6 mm
Candida albicans ATCC 2091 , 100 mg/ml	8 mm	3/2mg/disk	7mm

غلظتهاای 160 میلی گرم بر دیسک تا 320 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره الکلی به مقدار 25 و 35 میکرولیتر به ترتیب ببروی دیسک استاندارد *Blank Disk* و چاهک ریخته شد که نتیجه بدست آمده گویای این امر بود که عصاره الکلی تشنه داری هیچ گونه اثر مهاری ییر روی کاندیدا آلبیکنس ندارد.

بحث

با توجه به سیر روز افزون ابتلا به بیماری های قارچی در افراد مستعد از جمله مبتلایان به ایدز، افراد دیابتی، مصرف کنندگان آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و افرادی که شیمی درمانی می شوند و از طرفی مقاومت دارویی اعم از ذاتی و اکتسابی، گرایش محققین را نسبت به مطالعه در زمینه داروهای گیاهی به دلیل تاثیر گذاری بهتر و عوارض جانبی کمتر افزایش داده است. در این تحقیق تاثیر مهاری عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری بر روی نمونه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه های واژینیت مورد بررسی قرار گرفت. با وجود اینکه ترکیبات شیمیایی این گیاه تا کنون شناسایی نشده اما در زمینه داروهای گیاهی مطالعات فراوانی ببروی کاندیدا آلبیکنس انجام شده است. تنها مطالعه ای که به بررسی ضد میکروبی گیاه تشنه داری را مورد بررسی قرار داده بود مربوط به عباسی و همکاران در سال 1383 است که اثر عصاره تشنه داری را روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروبیونزا در محیط آزمایشگاهی بررسی کرده و به اثر ضد باکتریایی آن که معادل بتادین است پی برند (10). در مطالعه ای دیگر که توسط شرافتی چالشتی در سال 1387 بمنظور بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی گیاه گل میمونی (*scrophularia striata*) بر ارششا کلی انجام شد نشان داد که عصاره آبی گیاه گل میمونی فاقد اثر مهاری بر ارششا کلی میباشد اما نتایج *MIC* و *MFC*

بسته شد. در این چاهک ها 30 میکرولیتر غلظت های 10 - 20 - 40 - 80 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره الکلی و آبی ریخته شد. بعد از کشت دادن و تعییه چاهک و انتشار در آگار، محیط های کشت به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس نتایج حاصل در 24 و 48 ساعت پس از کشت قرائت و ثبت شد. شایان ذکر است که در این آزمایش از سویه استاندارد *MFC MIC ATCC 2091* استفاده شد. برای تعیین *BHI broth* نیز از روش براث ماکرو دایلوجن واز محیط کشت استفاده شد.

یافته ها

نتایج اثر مهاری عصاره آبی نتایج به دست آمده گویای اثر مهاری بسیار انک در بیشترین غلظت (100 میلی گرم بر میلی لیتر) یعنی در غلظت های 10 تا 80 میلی گرم بر میلی لیتر در روش انتشار در آگار و غلظت های 160 میکرو گرم بر دیسک تا 2000 میکرو گرم بر دیسک در روش دیفیوژن از عصاره بر روی نمونه هابود هاله عدم رشدی مشاهده نشد، اما قطر هاله در بالاترین غلظت به اندازه ای نبوده که بتوان در ادامه مطالعه *MIC MFC* را تعیین کرد. این آزمایش بروی سویه های استاندارد نیز انجام گرفت که نتایج حاصل، مشابه نتایج فوق بود. نمونه های کشت داده شده و همچنین نمونه استاندارد نسبت به داروی ضد قارچی فلو کنазول مقاوم بوده، و دیسک های حاوی این ماده بروی آنها هیچ گونه اثر مهاری نداشت، که این امر نشان دهنده مقاوم بودن آنها نسبت به این دارو می باشد (جدول 1).

نتایج حاصل از عصاره الکلی

داد که نوع عصاره می تواند در استخراج ترکیبات موثر این گیاه و سایر گیاهان مهم باشد (14). در نتایج حاصل از مطالعه خانم مدنی که به منظور مقایسه تأثیر انواع عصاره های گیاه آلیوم جسدیانوم بر سویه های مختلف کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت نتایج نشان داد که عصاره اتانولی، متانولی، خیسانده و جوشانده آلیوم جسدیانوم هیچ گونه اثر ضد قارچی ندارند، اما فعالیت ضد کاندیدایی عصاره حاصل از دم کردن گیاه و شیرابه تغفیل شده بر کاندیدا آلبیکنس، نتایج چشم گیری را به همراه داشته است (15). همچنین مطالعه محمدعلی نیز نشان دهنده اثرمهاری آویشن برروی کاندیدا بود که اثر مهاری این دو عصاره نسبت به عصاره آبی و الکلی تشنیه داری قابل مقایسه نیست و اثر مهاری این عصاره به مراتب کمتر از دیگر عصاره است (16).

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه و عدم شناخت از ترکیبات موجود در گیاه تشنیه داری میتوان ادعا نمود که "احتمالاً" عصاره الکی گیاه فاقد مواد موثره است. ترکیباتی که در عصاره آبی این گیاه وجود دارد میتواند دارای خاصیت ضد کاندیدایی ضعیفی باشد پیشنهاد میشود که مطالعه خاصه عصاره فنولی این گیاه انجام شود.

REFERENCES

- Nasrolahi Z, Yadegari MH, Moazeni SM. Antifungal effect green tea polyphenols (*Camellia sinensis*) on *Candida albicans*. J Med Sci 2009; 12: 71-77.
- Menon T, Umamaheswari K, Kumarasamy N, Solomon S, Thyagarajan SP. Efficacy of fluconazole and itraconazole in the treatment of oral candidiasis in HIV patients. Acta Trop 2001; 80: 151-54.
- Panácek A, Kolár M, Vecerová R, Prucek R, Soukupová J, Krystof V, et al. Antifungal activity of silver nanoparticles against *Candida* spp. Biomaterials 2009; 30: 6333-40.
- Perumal P, Mekala S, Chaffin WL. Role for cell density in antifungal drug resistance in *Candida albicans* biofilms. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51: 2454-63.
- Seneviratne CJ, Jin LJ, Samaranayake YH, Samaranayake LP. Cell density and cell aging as factors modulating antifungal resistance of *Candida albicans* biofilms. Antimicrob Agents Chemother 2008; 52: 3259-66.
- Pfaller MA, Diekema DJ. Epidemiology of invasive candidiasis: a persistent public health problem. Clin Microbiol Rev 2007; 20: 133-63.
- Jabra-Rizk MA, Falkler WA, Meiller TF. Fungal biofilms and drug resistance. Emerg Infect Dis 2004; 10: 14-19.
- Kanafani ZA, Perfect JR. Antimicrobial resistance: resistance to antifungal agents: mechanisms and clinical impact. Clin Infect Dis 2008; 46: 120-28.
- Otag WM, Grierson DS, Ndip RN. Antifungal activity of *Arctotis arctotoides* (L.f.) O. Hoffm. and *Gasteria bicolor* Haw against opportunistic fungi associated with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome. Pharmacogn Mag 2012; 8: 135-40.
- Abbasi N, Abdi M, Azizi Jalilian F, Seifmanesh M. Antimicrobial effect of extracts of *Scrophularia striata* on *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* and comparison with selective effective antibiotics [MD thesis]. Ilam: Ilam University of Medical Sciences; 2004. [In Persian]
- Sharafati-chaleshtori F, Sharafati-chaleshtori R, Momeni M. Antimicrobial effect of ethanolic and aqueous extracts of *Scrophularia striata* Of *E. coli* in vitro. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2010; 1: S32-37.

عصاره اتانولی این گیاه بترتیب 90 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر بود (11). در مطالعه ای دیگر که توسط بهمنی در سال 1389 به منظور بررسی مقایسه اثر گیاه گل میمونی بیابانی (*Scrophularia deserti*) با آمفوتربیسین *B* بر روی کاندیدا آلبیکنس انجام شد حداقل غلظت ممانعت از رشد سری اول و دوم عصاره اتانولی گل میمونی بیابانی 59 درصد و 58 درصد و برای آمفوتربیسین *B* به میزان 59 درصد مشخص شد (12). در مطالعه شرافتی چالشتی در سال 1388 که به منظور بررسی اثر ضد میکروبی و تعیین میزان مطالعه اتانولی گل میمونی فلاونوئیدی و فلاونولی عصاره اتانولی گل میمونی (*MIC*) (Scrophularia striata) انجام شد مقادیر *MIC* به ضد میکروبی و آنالیز ترکیبات تشنیه داری از تیره گیاه گل میمونی است و محققین دیگر اثر تشکیل دهنده این تیره مشخص نموده است که حاوی ترکیبات ضد میکروبی می باشد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از بی اثر بودن عصاره آبی و الکلی بر روی کاندیدا می باشد که نشان دهنده عدم وجود ترکیبات ضد قارچی موثر در این عصاره می باشد. نتایج این مطالعه مانند مطالعات دیگر نشان

12. Bahmani M, Ghorbani M, Momtaz H, Bahmani E, Rafieian M. The comparison of the in-vitro effects of *Scrophularia deserti* plant and amphotericin B on *Candida albicans*. Journal of Arak Medical University 2011; 13: 15-21.
13. Sharafati-chaleshtori R, Sharafati-chaleshtori F, Sharafati-chaleshtori A, Ashrafi K. Antimicrobial effects and evaluation of total phenols, flavonoids and flavonols contents of ethanolic extracts of *Scrophularia striata*. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2010; 1: S32-37.
14. Ghahfarokhi M, Sattari M, Yadegari MH, Gudarzi GHR, Saharkhiz MJ. Antifungal activity of essential oils and extracts Ajowan against clinical isolates *Candida albicans* resistant to fluconazole in vitro. Modares J Med Sci 2008; 1: 91-7.
15. Madani M, Khosravi A, Shirani M. Effects of plant extracts *Allium jesdianum*: the different strains *Candida* in vitro. Journal of Biological Science Lahijan 2009; 1: 63-71.
16. Zia MA, Bayat M, Khalkhali H. In vitro antifungal effect of *Thymus vulgaris* essence on *Candida albicans* isolated from patients with oral candidiasis. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2011; 13: 44-52.